

TABLEAU 1. Critères de classification des patientes en soins après avortement

Avait certainement subi un avortement provoqué (au moins un des critères suivants)

La patiente a déclaré avoir fait quelque chose pour provoquer l'avortement.

Le prestataire a déclaré avoir l'impression que la patiente avait fait quelque chose pour provoquer l'avortement.

Le prestataire a signalé des signes de traumatisme ou de corps étranger dans les voies génitales de la patiente.

Avait probablement subi un avortement provoqué (deux critères suivants)

Le prestataire a déclaré avoir observé des signes de septicémie/péritonite.

La patiente a déclaré une grossesse non planifiée†.

Avait peut-être subi un avortement provoqué (un des critères suivants)

Le prestataire a déclaré avoir observé des signes de septicémie/péritonite.

La patiente a déclaré une grossesse non planifiée†.

Avait vraisemblablement eu un avortement spontané

Toutes les autres patientes en soins après avortement

†La patiente a déclaré ne pas pratiquer de méthode contraceptive au moment de la conception ou ne pas désirer la grossesse à ce moment ou du tout.

TABLEAU 2. Critères médicaux de classification de la morbidité liée à l'avortement

Signes d'avortement, mais sans morbidité (tous les critères suivants)

La femme a déclaré avoir utilisé du misoprostol

Aucun symptôme/signe de morbidité†

Température $\geq 35,1$ °C mais $\leq 38,9$ °C sans signes cliniques d'infection‡

Admission pendant moins de 24 heures et sortie de l'établissement en bonne santé

Légère morbidité (tous les critères suivants)

La femme a utilisé du misoprostol et a été hospitalisée pendant au moins 24 heures ou la femme n'a pas utilisé de misoprostol

Température $\geq 35,1$ °C mais $\leq 38,9$ °C sans signes cliniques d'infection‡

Hémorragie sans besoin de transfusion sanguine

Morbidité moyenne (au moins un des critères suivants)

Température de 37,3 à 38,9 °C avec signes cliniques d'infection‡

Signes cliniques d'infection seuls‡

Aucun signe de choc§

Aucune défaillance d'organe ou de système††

Hémorragie sans besoin de transfusion sanguine

Morbidité grave (au moins un des critères suivants)

Mort

Choc§

Défaillance d'organe/de système††

Température ≥ 39 °C ou < 35 °C (hypothermie) avec signes cliniques d'infection‡



Péritonite généralisée

Hémorragie nécessitant une transfusion sanguine

†Sans saignement cliniquement significatif (sans besoin d'intervention clinique) ni signes d'infection.

‡Peut inclure température $\geq 37,3$ °C et sensibilité abdominale/utérine avec ou sans pertes vaginales malodorantes, abcès pelvien ou péritonite pelvienne. §Peut se manifester sous forme de tension artérielle systolique ≤ 80 mmHg persistante seule ou tension artérielle systolique ≤ 90 mmHg persistante avec fréquence du pouls d'au moins 120 bpm, et agitation, niveau de conscience réduit, périphéries froides et moites, nécessitant l'administration de liquides intraveineux. ††Peut inclure insuffisance hépatique, insuffisance rénale, arrêt ou insuffisance cardiaque, syndrome de détresse respiratoire, coma ou coagulopathie intravasculaire disséminée.

FIGURE 1. Répartition en pourcentage des patientes en soins après avortement dans les établissements de santé de Kinshasa, par catégorie d'avortement, 2016



TABEAU 3. Répartition en pourcentage des patientes en soins après avortement dans les établissements de santé de Kinshasa, en fonction de caractéristiques sélectionnées; et rapports de cote (et intervalles de confiance à 95%) des analyses de régression logistique évaluant la probabilité que les patientes aient subi un avortement provoqué, par caractéristiques sélectionnées, suivant le type d'avortement

Caractéristique	%	RC‡	
		Peut-être/certainement provoqué c.spontané	Certainement provoqué c.peut-être provoqué et spontané
	(N=867)		
Âge			
15 à 19 ans	15,7	1,42 (0,71–2,84)	na
20 à 24 ans	22,9	1,19 (0,52–2,71)	2,13 (1,08–4,19)*
25 à 29 ans	26,7	1,09 (0,57–2,07)	na
30 à 34 ans	17,3	1,07 (0,57–2,03)	na
35 à 49 ans (réf.)	17,4	1,00	1,00
Situation matrimoniale			
Non mariée§	59,5	13,59 (6,50–28,41)**	3,45 (2,13–5,59)**
Mariée (réf.)	40,5	1,00	1,00
Éducation			
≤ primaire	13,2	1,11 (0,45–2,74)	na
Secondaire incomplète	35,7	1,74 (0,79–3,85)	na
Secondaire achevée	35,5	1,50 (0,82–2,76)	na
Tertiaire (réf.)	15,7	1,00	na
Situation de pauvreté			
Pauvre	40,4	1,42 (0,93–2,15)†	na
Non pauvre (réf.)	59,6	1,00	na
Avortement antérieur			
0 (réf.)	72,9	1,00	na
≥ 1	27,1	2,05 (1,12–3,74)*	na
Âge gestationnel au moment de l'interruption de la grossesse			
Premier trimestre (réf.)	80,9	1,00	na
Après le premier trimestre††	19,1	0,75 (0,44–1,27)	na
Total	100,0	na	na

*Significatif à $p < 0,05$. **Significatif à $p < 0,01$. †Significatif à $p < 0,10$. ‡Résultats d'un modèle de probabilité proportionnelle partielle par gologit2 dans Stata; les variables à groupe RC unique répondent à l'hypothèse de probabilité proportionnelle. §Comprend les femmes ayant déclaré n'avoir jamais été mariées (38%), vivant en couple avec un homme (18%) et séparées/divorcées (4%). ††Comprend cinq cas d'interruption de grossesse déclarée durant le troisième trimestre. N.B.: na=non applicable. réf.=catégorie de référence. Les pourcentages sont calculés avec pondération.

FIGURE 2. Répartition en pourcentage des patientes en soins après avortement, suivant la gravité des complications





TABLEAU 4. Rapports de cote (et intervalles de confiance à 95%) des analyses de régression évaluant la probabilité de complications des patientes en soins après avortement, par caractéristiques sélectionnées, suivant la gravité de la morbidité liée à l'avortement

Caractéristique	RC†	
	Moyenne/grave c. nulle/légère	Grave c. nulle/moyenne/légère
Âge		
15 à 19 ans	0,68 (0,41–1,12)	na
20 à 24 ans	0,51 (0,30–0,86)*	na
25 à 29 ans	0,67 (0,37–1,15)	0,29 (0,15–0,56)**
30 à 34 ans	0,62 (0,34–1,14)	na
35 à 49 ans (réf.)	1,00	1,00
Situation matrimoniale		
Célibataire	1,84 (1,12–3,03)*	na
Mariée (réf.)	1,00	na
Vivant en couple avec un homme	1,87 (1,14–3,08)**	na
Séparée/divorcée/veuve	0,96 (0,41–2,22)	na
Éducation		
≤ primaire	1,75 (0,82–3,71)	na
Secondaire incomplète	1,11 (0,57–2,18)	na
Secondaire achevée	1,38 (0,75–2,54)	na
Tertiaire (réf.)	1,00	na
Situation de pauvreté		
Pauvre	1,90 (1,24–2,90)**	na
Non pauvre (réf.)	1,00	na
Avortement antérieur		
0 (réf.)	1,00	1,00
≥ 1	1,28 (0,87–1,87)	0,56 (0,32–0,95)*
Âge gestationnel au moment de l'interruption de la grossesse		
Premier trimestre (réf.)	1,00	1,00
Après le premier trimestre‡	1,06 (0,66–1,70)	3,66 (2,26–5,93)*
A déclaré avoir provoqué l'avortement		
Oui	1,73 (1,05–2,84)*	na
Non (réf.)	1,00	na

*Significatif à $p < 0,05$. **Significatif à $p < 0,01$. †Résultats d'un modèle de probabilité proportionnelle partielle par gologit2 dans Stata; les variables à groupe RC unique répondent à l'hypothèse de probabilité proportionnelle. ‡Comprend cinq cas d'interruption de grossesse déclarée durant le troisième trimestre. N.B.: na=non applicable. réf.=catégorie de référence. Voir le Tableau 2 pour la classification de la morbidité liée à l'avortement.

TABLEAU 5. Répartition en pourcentage des patientes en soins après avortement, par mesures de prise en charge clinique et traitement, selon la gravité de la morbidité liée à l'avortement

Mesures	Total (N=867)	Nulle/légère (N=349)	Moyenne (N=351)	Grave (N=167)
Méthode d'évacuation†				
Dilatation et curetage	49,2	45,3	51,6	51,6
Aspiration manuelle/ électrique intra-utérine	13,9	17,2	11,8	11,7
Misoprostol	10,2	9,6	10,2	11,7
Curetage digital	22,8	24,9	23,0	17,2
Évacuation forceps	0,5	0,1	0,0	3,1
Autres	3,5	2,9	3,5	4,8
Type de prestataire*				
Médecin	54,2	54,3	49,6	67,4
Prestataire de niveau intermédiaire	45,9	45,7	50,4	32,6
Médication analgésique				
Oui	10,9	8,9	11,3	14,5
Non/sans réponse	65,9	65,7	65,1	68,4
Non requise‡	23,3	25,5	23,6	17,1
Âge gestationnel au moment de l'interruption de la grossesse**				
Premier trimestre	80,9	81,2	87,1	61,8
Deuxième trimestre	18,7	18,2	12,5	38,0
Troisième trimestre	0,4	0,6	0,4	0,2
Durée du séjour en structure**				
< 24 heures	58,6	73,2	57,6	25,9
≥ 24 heures	41,4	26,8	42,4	74,1
Avortement provoqué supposé par le prestataire*				
Oui	52,0	41,1	58,2	60,3
Non	44,9	54,6	39,1	37,9
Ne sait pas	3,2	4,3	2,7	1,9
Patiente déclare avoir provoqué l'avortement*				
Oui	41,6	33,3	47,2	45,3
Non	58,4	66,7	52,8	54,7
Patiente a reçu une méthode contraceptive				
Oui	15,0	12,8	15,8	20,3
Non	84,5	86,6	83,5	79,7
Ne sait pas	0,5	0,6	0,7	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

*Significatif à $p < 0,05$. **Significatif à $p < 0,01$. †Significatif à $p < 0,10$. ‡Misoprostol utilisé pour traitement. N.B.: na=non applicable. Astérisques basés sur la valeur p du test chi carré de Pearson de l'association entre la gravité et le type de service reçu et les caractéristiques de l'avortement. Voir le Tableau 2 pour la classification de la morbidité liée à l'avortement.