

Datos sobre la salud sexual y reproductiva de la juventud guatemalteca

RELACIONES SEXUALES TEMPRANAS

- El 83% de los hombres adultos jóvenes* tuvo relaciones sexuales por primera vez antes de cumplir los 20 años, en comparación con el 58% de las mujeres.
- Esta diferencia de género es mucho menor que el promedio en los jóvenes indígenas (74% de los hombres indígenas vs. 68% de las mujeres indígenas).
- Una mayor proporción de mujeres rurales que de urbanas tuvo relaciones sexuales antes de los 20 años—63% vs. 50%, probablemente debido a que las mujeres rurales se casan antes. La situación es la inversa en los hombres (78% de hombres rurales vs. 88% de hombres urbanos).
- El 95% de todas las mujeres sexualmente activas de 15–24 años, y sólo el 46% de los hombres similares, están casados—esto es, viven en unión consensual o legal.

MATRIMONIO TEMPRANO

- Los matrimonios que involucran a mujeres adolescentes son mayormente uniones consensuales en lugar de legales (59% consensuales vs. 41% legales).
- El 50% de las adultas jóvenes guatemaltecas se casó antes de cumplir los 20 años, en comparación con el 65% de las que ahora tienen 40–44 años. Es probable que esta disminución considerable esté asociada con importantes avances en la educación de las mujeres en las pasadas dos décadas.
- En la actualidad, proporciones prácticamente idénticas de mujeres y hombres jóvenes tienen algún grado de instrucción secundaria (39–40%).
- Las proporciones de adultas jóvenes que se casaron durante la adolescencia, son mucho más altas entre las mujeres de menor escolaridad† (66%), de grupos indígenas (64%) y de residencia rural

(57%) que entre las mujeres de mayor escolaridad (26%), de grupos no indígenas (45%) y de residencia urbana (41%).

MATERNIDAD ADOLESCENTE

- El 44% de las adultas jóvenes dio a luz antes de los 20 años. Esta proporción es más alta que el promedio en mujeres con un bajo nivel socioeconómico‡ (62%), mujeres con menor escolaridad (58%) y mujeres indígenas (54%).
- La tasa de fecundidad adolescente en Guatemala—114 nacimientos por 1,000 mujeres de 15–19 años—es una de las más altas en América Latina y el Caribe, en donde el promedio regional es de 80 por 1,000.
- Aún cuando esta tasa ha disminuido marcadamente (debido a que las mujeres tienen ahora menos segundos y terceros hijos siendo adolescentes), la proporción de mujeres que se convirtieron en madres antes de los 20 años apenas ha cambiado en las pasadas dos décadas.


- Muchos nacimientos en adolescentes son imprevistos o no deseados: el 29% de los nacimientos recientes en mujeres adolescentes fueron no planeados.

USO DE ANTICONCEPTIVOS Y NECESIDAD INSATISFECHA

- El 89–91% de las mujeres sexualmente activas de 15–24 años, independientemente de su estado marital, no desea

Actividad sexual y estado marital

Que en la actualidad la gente joven sea sexualmente activa* y que dicha actividad tenga lugar dentro de una unión difiere ampliamente según el género.



*Adultos jóvenes son las personas de 20–24 años; adolescentes son las de 15–19 años.


†Menor escolaridad denota menos de 7 años de estudios; mayor escolaridad, 7 o más años.

‡La categorización del nivel socioeconómico se basa en un índice de bienes y servicios, y características de la vivienda.

Tendencias en la maternidad adolescente

La proporción de mujeres que dan a luz en la adolescencia ha cambiado muy poco en las últimas décadas, a excepción de Nicaragua.

% que dio a luz en la adolescencia, según edad actual



tener un hijo en los próximos dos años.

- El 68% de las mujeres casadas de 15–24 años que todavía no han tenido un hijo, desea aplazar un primer parto.

- A nivel nacional, el 25% de las mujeres casadas de 15–24 años usa un método moderno de anticoncepción; por subgrupo, la proporción varía desde un 10% en las mujeres indígenas hasta un 38% en las mujeres de residencia urbana.

- Los métodos modernos más comúnmente usados son los inyectables (usados por el 14% de las mujeres sexualmente activas) y la píldora (5%).

- El 53% de las mujeres casadas de 15–24 años tiene una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna;* las mujeres del más bajo nivel socioeconómico presentan el nivel de necesidad insatisfecha más alto (64%).

CONOCIMIENTO DEL VIH Y CONDUCTAS DE RIESGO

- El 49% de los hombres adultos jóvenes, y solamente el 32% de mujeres, citan espontáneamente el uso del condón cuando se les pregunta sobre formas para prevenir el VIH.

neamente el uso del condón cuando se les pregunta sobre formas para prevenir el VIH.

- Las y los jóvenes adultos casados tienen mucha menor probabilidad que los solteros de usar condones, lo que sugiere que las mujeres jóvenes casadas están en mayor riesgo de contraer el VIH que las mujeres solteras sexualmente activas.

LA JUVENTUD GUATEMALTECA Y SUS VECINOS

Las siguientes características distinguen a la juventud guatemalteca de la juventud de los países vecinos de El Salvador, Honduras y Nicaragua:

- La probabilidad de que una mujer adolescente esté casada legalmente es la más alta en Guatemala: el 41% de las uniones de adolescentes guatemaltecas son uniones formales, vs. 10–23% de las uniones de adolescentes en los otros países.

- La necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna en mujeres casadas de 15–24 años

es la más alta en Guatemala (53% vs. 27–36%).

- Guatemala tiene la tasa más baja de uso de anticoncepción moderna en mujeres casadas de 15–24 años (25% vs. 47–58%).

- La proporción de mujeres jóvenes sexualmente activas que no usa ningún método anticonceptivo es mucho mayor en Guatemala (68% vs. 40–46%); y una mayor proporción de no usuarias en Guatemala aduce desconocer un método o no tener acceso a servicios como la principal razón que explica el no uso (44% vs. 22%).

- Entre las mujeres de 15–24 años que dan a luz, las guatemaltecas tienen la menor probabilidad de tener partos atendidos profesionalmente (52% vs. 74–77%).

- La proporción de nacimientos no planeados es menor en las adolescentes guatemaltecas (29% vs. 43–47%).

- La proporción de todas las mujeres sexualmente activas de 15–24 años que es soltera es la más baja en Guatemala (5% vs. 13–23%).

- Entre los hombres de 15–24 años, los guatemaltecos tienen menor probabilidad de haber tenido parejas múltiples en el pasado año, ya sean casados (9% vs. 21–24%) o solteros (32% vs. 41–50%).

- Los hombres adultos jóvenes guatemaltecos tienen una menor probabilidad que los hombres de los otros tres países de mencionar espontáneamente el uso del condón como una forma de prevenir el VIH (49% vs. 64–68%).

Los hallazgos presentados aquí se basan en tabulaciones especiales de los datos disponibles más recientes, mismos que provienen de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002 (para las mujeres) y la Encuesta Nacional de Salud Masculina 2002 (para los hombres). Las muestras de 805 hombres y 3,358 mujeres de 15–24 años fueron lo suficientemente grandes para ser representativas a nivel nacional y por subgrupo según el área de residencia, logro educativo, nivel socioeconómico y origen étnico. Las tendencias en el tiempo se basan en comparaciones de personas que actualmente tienen 20–24 años y 40–44 años. Todas las cifras presentadas son datos ponderados. Para mayor información y detalles sobre las fuentes utilizadas para comparaciones subregionales (no todos los indicadores estaban disponibles para todos los países), ver Remez L et al., Asegurar un mañana más saludable en Centroamérica: proteger la salud sexual y reproductiva de la juventud de hoy, documento que está disponible en <www.gutmacher.org>. El apoyo para este proyecto provino de Sida, la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional.



Progresando en la salud sexual y reproductiva en el mundo a través de la investigación, el análisis de políticas y la educación pública

New York
125 Maiden Lane
New York, NY 10038, EEUU
Tel: 212.248.1111
info@gutmacher.org

Washington DC
1301 Connecticut Ave NW, Suite 700
Washington, DC 20036, EEUU
Tel: 202.296.4012,
policyinfo@gutmacher.org

www.gutmacher.org

*El nivel de necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna es la proporción de mujeres sexualmente activas que son fértiles, que no quieren embarazarse en los próximos dos años y que, sin embargo, no usan un método moderno.