

CUADRO 1. Porcentaje de mujeres casadas o en unión consensual entre 0 y 11 meses postparto con necesidad insatisfecha de algún método anticonceptivo, por medida; e indicadores de contexto seleccionados, por región y país

País (Abreviatura)	Año de la encuesta	Medida de necesidad insatisfecha			Indicadores de contexto selectos†		
		EDS	Situación actual	Prospectiva	Tasa global de fecundidad	% nacimientos a intervalos <24 meses.	Mediana de meses de no susceptibilidad
África Occidental / Central							
Rep.Dem.del Congo (CD)	2007	32.4	8.3	61.2	6.3	26.0	12.1
Nigeria (NG)	2008	19.5	8.9	65.3	5.7	23.8	13.8
República del Congo (CG)	2005	28.6	3.9	53.7	4.8	13.2	11.8
Ghana (GH)	2008	50.6	10.9	82.0	4.0	14.0	12.4
África Oriental/del Sur							
Uganda (UG)	2011	47.5	13.2	75.1	6.2	25.3	11.0
Kenia (KE)	2008–9	36.7	11.3	63.2	4.6	22.6	10.3
Zimbabue (ZW)	2010–11	14.6	3.0	26.1	4.1	8.8	12.7
Lesoto (LS)	2009	40.4	8.6	57.8	3.3	12.4	11.5
África del Norte/Asia							
Pakistán (PK)	2012–13*	30.5	19.3	52.9	3.8	36.6	4.4
Jordania (JO)	2012*	14.8	10.5	25.4	3.5	31.9	3.1
Indonesia (ID)	2012	12.6	6.2	27.9	2.6	10.5	3.8
Marruecos (MO)	2003–4*	13.1	6.2	23.2	2.5	16.6	3.1
América Latina/Caribe							
Guyana (GY)	2009	39.8	21.3	57.4	2.8	24.8	4.3
Rep.Dominicana (DR)	2007	20.8	12.3	27.7	2.4	23.4	3.4
Perú (PE)	2012	18.9	3.0	31.9	2.6	11.8	10.4
Honduras (HN)	2011–12	13.5	3.7	27.2	2.9	15.3	8.6


*La muestra solamente incluye mujeres casadas. †Fuente: StatCompiler, MeasureDHS.com.

CUADRO 2. Porcentaje de mujeres amenorreicas, sexualmente activas entre 0 y 23 meses postparto que no deseaban tener otro hijo en los siguientes dos años y que expresaron razones seleccionadas para no usar anticonceptivos por región y país

País	Amenorrea %	Amamantamiento %	Salud / efectos secundarios %	Opposición %	Falta acceso o conocimientos %	Rel.sexuales infrecuentes %
África Occidental / Central						
Rep.Dem.del Congo	14	27	19	26	23	8
Nigeria	1	18	9	39	21	2
Rep.del Congo	27	25	11	7	18	6
Ghana	12	29	29	18	4	8
África Oriental/del Sur						
Uganda	38	29	24	16	8	4
Kenia	10	20	26	19	13	4
Zimbabue	8	30	13	28	5	8
Lesoto	23	21	15	14	13	12
África del Norte/Asia						
Pakistán	53	26	10	13	4	6
Jordania	34	36	22	4	2	14
Indonesia	21	22	13	3	3	8
Marruecos	53	8	12	7	0	18
América Latina/Caribe						
Guyana	2	14	23	12	7	7
Rep.Dominicana	25	39	15	10	4	6
Perú	44	19	12	4	3	21
Honduras	24	38	8	26	7	16

Nota: Se permiten múltiples razones.


FIGURA 1. Diferencia en puntos porcentuales absolutos en el uso de métodos modernos entre mujeres amamantando y no amamantando entre 0 y 11 meses postparto que habían reanudado relaciones sexuales y menstruación, por región y país



Notas: El grupo de referencia (codificado como 0) consta de mujeres que no están amamantando. Ver Cuadro 1 para abreviaturas de países.

FIGURA 2. Porcentaje de todas las mujeres expuestas que no desean un hijo dentro de los siguientes dos años pero que no están usando algún método, por duración postparto, por región y país

África Occidental/Central y Oriental/del Sur



África del Norte/Asia y América Latina/Caribe

