

**TABLEAU 1. Pourcentages de répartition des femmes âgées de 15 à 49 ans de villes sélectionnées au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, par caractéristiques, projet MLE, 2010–2011**

Caractéristique	Kenya (N=5 588)	Nigeria (N=8 880)	Sénégal (N=4 952)
<b>Âge</b>			
15 à 19 ans	10,2	14,0	18,7
20 à 24 ans	29,2	17,2	22,1
25 à 29 ans	24,6	20,7	18,3
30 à 34 ans	15,0	17,6	14,3
35 à 39 ans	10,6	14,1	12,3
40 à 44 ans	6,5	9,4	8,8
45 à 49 ans	3,9	7,1	5,6
<b>Éducation</b>			
Aucune/coranique	5,9	8,4	30,9
Primaire	36,4	14,3	33,4
Secondaire	39,8	48,0	29,0
>secondaire	17,9	28,6	6,7
Info manquante	0,0	0,7	0,0
<b>Religion</b>			
Musulmane	9,8	48,2	89,7
Non musulmane	90,1	51,2	10,3
Info manquante	0,1	0,6	0,0
<b>État matrimonial</b>			
Jamais mariée	32,9	31,6	39,7
Mariée ou l'ayant été	67,1	68,4	60,3
<b>Quintile de richesse</b>			
Le plus pauvre	17,0	16,4	18,7
Deuxième	19,4	18,7	19,2
Moyen	19,5	19,9	19,8
Quatrième	20,8	21,4	19,4
Le plus riche	23,4	23,6	22,9
<b>Ville de résidence</b>			
Dakar/Abuja/Nairobi	74,8	17,4	48,8
Guédiawaye/Ibadan/Mombasa	19,8	29,6	12,6
Pikine/Ilorin/Kisumu	5,4	23,6	13,2
Mbao/Kaduna/na†	na†	29,4	25,3
<b>Méthode moderne‡</b>			
Oui	42,1	26,5	16,9
Non	57,9	73,5	83,1
Total	100,0	100,0	100,0

†na=non applicable. ‡Les méthodes modernes incluent la pilule, le stérilet, le contraceptif injectable, l'implant, la pilule contraceptive d'urgence, la méthode de l'aménorrhée liée à l'allaitement, le préservatif (masculin et féminin), le spermicide, le diaphragme ou la stérilisation (masculine ou féminine). N.B.: Tous les pourcentages sont pondérés et reposent sur des échantillons analytiques qui excluent les femmes présentant des données manquantes et celles issues d'unités primaires comptant moins de cinq observations.

**TABLEAU 2. Pourcentage des femmes et des hommes qui se disent d'accord avec les mythes relatifs à la planification familiale sélectionnés, par pays**

Mythe	Kenya		Nigeria		Sénégal	
	Femmes (N=5 684)	Hommes (N=2 477)	Femmes (N=9 130)	Hommes (N=5 041)	Femmes (N=5 109)	Hommes (N=2 244)
L'injection contraceptive peut rendre une femme stérile de façon permanente	51,7	52,1	41,0	31,2	34,0	31,6
Les gens qui utilisent la contraception finissent par avoir des problèmes de santé	74,1	71,8	47,6	37,7	58,9	50,0
Les contraceptifs peuvent endommager l'utérus	62,1	na	42,4	na	36,9	44,1
Les contraceptifs réduisent le désir sexuel des femmes	59,1	61,2	22,7	25,9	24,7	39,6
Les contraceptifs peuvent causer le cancer	55,5	51,7	25,2	30,1	24,0	26,0
Les contraceptifs peuvent donner des enfants déformés	62,0	59,6	26,0	33,7	23,2	24,5
Les contraceptifs nuisent à la santé des femmes	71,5	68,0	46,6	43,2	50,2	43,8
La planification familiale/l'espacement des naissances femmes encouragent les mœurs légères chez les femmes	35,0	40,2	23,0	25,7	na	na
La planification familiale/l'espacement des naissances sont une affaire de femmes et les hommes ne doivent pas s'en inquiéter	na	15,6	na	13,9	na	na
Moyen (étendue)†	4,6 (0-8)	4,3 (0-8)	2,7 (0-8)	2,5 (0-8)	2,6 (0-7)	2,8 (0-7)

†Nombre moyen de réponses positives sur huit (sept au Sénégal) mythes sur la planification familiale. N.B.: na=non applicable. Tous les pourcentages sont pondérés et basés sur les femmes et les hommes qui connaissent au moins une méthode de contraception moderne.

**TABLEAU 3. Pourcentage moyen (et écart type) des femmes et des hommes par unité primaire d'échantillonnage qui se disent d'accord avec les mythes sélectionnés sur la planification familiale, par pays**

Mythe	Kenya		Nigeria		Sénégal	
	Femmes (N=287)	Hommes (N=265)	Femmes (N=339)	Hommes (N=334)	Femmes (N=155)	Hommes (N=153)
L'injection contraceptive peut rendre une femme stérile de façon permanente	0,50 (0,15)	0,54 (0,22)	0,40 (0,18)	0,32 (0,23)	0,38 (0,16)	0,36 (0,22)
Les gens qui utilisent la contraception finissent par avoir des problèmes de santé	0,75 (0,13)	0,75 (0,19)	0,47 (0,20)	0,39 (0,24)	0,63 (0,17)	0,53 (0,23)
Les contraceptifs peuvent endommager l'utérus	0,63 (0,17)	na	0,42 (0,18)	na	0,43 (0,18)	0,47 (0,25)
Les contraceptifs réduisent le désir sexuel des femmes	0,61 (0,15)	0,61 (0,22)	0,22 (0,15)	0,27 (0,24)	0,30 (0,18)	0,45 (0,25)
Les contraceptifs peuvent causer le cancer	0,55 (0,17)	0,54 (0,23)	0,25 (0,17)	0,29 (0,23)	0,28 (0,14)	0,32 (0,23)
Les contraceptifs peuvent donner des enfants déformés	0,65 (0,17)	0,65 (0,22)	0,25 (0,16)	0,34 (0,27)	0,27 (0,15)	0,31 (0,23)
Les contraceptifs nuisent à la santé des femmes	0,71 (0,15)	0,71 (0,22)	0,23 (0,18)	0,45 (0,27)	0,54 (0,19)	0,48 (0,24)
La planification familiale/l'espacement des naissances encouragent les mœurs légères chez les femmes.	0,31 (0,16)	0,43 (0,22)	0,46 (0,20)	0,28 (0,23)	na	na
La planification familiale/l'espacement des naissances sont une affaire de femmes et les hommes ne doivent pas s'en inquiéter	na	0,16 (0,15)	na	0,16 (0,17)	na	na
Niveau communautaire (global)†	0,93 (1,16)	0,53 (0,54)	0,39 (0,31)	0,30 (0,25)	0,71 (0,63)	0,43 (0,45)
Nombre moyen d'observations par unité primaire (étendue)	20,1 (6-37)	9,0 (5-21)	30,5 (6-61)	16,3 (5-40)	33,6 (11-62)	14,8 (5-37)

†Proportion pondérée globale des mythes avec lesquels les femmes ou les hommes des communautés se sont dits d'accord. N.B.: N=nombre d'unités primaires d'échantillonnage. na=non applicable.

**TABLEAU 4. Rapports de probabilité (et intervalles de confiance à 95%) issus des analyses de régression logistique examinant la probabilité d'usage féminin de la contraception moderne, suivant la croyance individuelle et communautaire aux mythes relatifs à la planification familiale, par pays**

Modèle	Kenya (N=5 128)	Nigeria (N=8 377)	Sénégal (N=4 562)
<b>Modèle 1</b>			
Croyances individuelles des femmes	0,65 (0,47–0,88)**	0,27 (0,22–0,34)***	0,22 (0,17–0,29)***
<b>Modèle 2</b>			
Croyances individuelles des femmes	0,65 (0,47–0,88)**	0,26 (0,21–0,32)***	0,22 (0,17–0,29)***
Croyances des femmes au niveau communautaire	1,01 (0,96–1,05)	1,43 (1,14–1,79)***	1,04 (0,74–1,45)
<b>Modèle 3</b>			
Croyances individuelles des femmes	0,64 (0,47–0,88)**	0,25 (0,21–0,31)***	0,22 (0,17–0,29)***
Croyances des femmes au niveau communautaire	1,00 (0,94–1,06)	1,63 (1,29–2,05)***	1,00 (0,72–1,41)
Croyances des hommes au niveau communautaire	1,04 (0,84–1,29)	0,57 (0,41–0,79)***	1,08 (0,90–1,29)

\*\* $p \leq 0,01$ . \*\*\* $p \leq 0,001$ . N.B.: Tous les modèles corrigent l'âge, l'éducation, la religion, l'état matrimonial, le quintile de richesse et la ville de résidence des femmes.

**TABLEAU 5. Rapports de probabilité (et intervalles de confiance à 95%) issus des analyses de régression logistique examinant la probabilité d'utilisation par les femmes de la contraception moderne au Nigeria, suivant la croyance individuelle et communautaire dans les mythes relatifs à la planification familiale, par ville**

Modèle	Abuja (N=1 872)	Ibadan (N=2 720)	Ilorin (N=2 124)	Kaduna (N=1 640)
<b>Modèle 1</b>				
Croyances individuelles des femmes	0,25 (0,17–0,39)***	0,26 (0,20–0,36)***	0,39 (0,27–0,57)***	0,24 (0,13–0,45)***
<b>Modèle 2</b>				
Croyances individuelles des femmes	0,26 (0,17–0,40)***	0,26 (0,19–0,34)***	0,38 (0,26–0,56)***	0,21 (0,11–0,40)***
Croyances des femmes au niveau communautaire	0,79 (0,40–1,60)	1,33 (0,78–2,26)	1,40 (0,66–3,0)	1,60 (1,20–2,14)**
<b>Modèle 3</b>				
Croyances individuelles des femmes	0,26 (0,17–0,40)***	0,26 (0,19–0,34)***	0,39 (0,27–0,57)***	0,23 (0,12–0,44)***
Croyances des hommes au niveau communautaire	0,55 (0,16–1,82)	1,46 (0,83–2,56)	0,61 (0,32–1,16)	0,53 (0,32–0,90)*
<b>Modèle 4</b>				
Croyances individuelles des femmes	0,26 (0,17–0,41)***	0,25 (0,18–0,34)***	0,36 (0,24–0,53)***	0,19 (0,09–0,37)***
Croyances des femmes au niveau communautaire	0,92 (0,45–1,91)	1,20 (0,69–2,11)	3,29 (1,25–8,66)*	1,87 (1,36–2,59)***
Croyances des hommes au niveau communautaire	0,60 (0,16–2,28)	1,33 (0,75–2,38)	0,33 (0,15–0,71)**	0,38 (0,21–0,67)***

\*p≤0,05. \*\*p≤0,01. \*\*\*p≤0,001. N.B.: Tous les modèles corrigent l'âge, l'éducation, la religion, l'état matrimonial et le quintile de richesse.