

Albania

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	12	10	14	10	16	15	12	10
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	19	18	20	10	17	24	27	18
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	53	53	53	48	51	63	51	53
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	68	72	65	48	69	75	71	72
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	1	0	1	0	1	0	1	0
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	1	1	2	1	3	1	1	0
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	15	15	16	11	16	23	15	13
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	23	22	24	18	22	26	27	21
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	8	5	9	6	11	10	6	4
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	1	1	1	0	0	3	1	1
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	38	28	47	42	44	56	34	19
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	8	6	11	14	15	10	6	2
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	20.8	20.8	20.7	22.1	20.8	19.9	20.7	20.8
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	22.3	24.5	21.1	22.3	21.1	20.6	21.9	†
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.5	3.7	0.4	0.2	0.3	0.7	1.2	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	20.8	21.3	20.4	22.8	20.1	20.9	21.6	20.4
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	26.7	29.1	25.1	25.7	25.6	24.4	27.1	29.6
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	5.9	7.8	4.7	2.9	5.5	3.5	5.5	9.2
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	46	39	50	55	50	44	40	35
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	81	83	79	87	70	82	82	85
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	2.9	3.2	2.8	2.6	3.0	2.8	3.1	3.2
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	63	*	[61]	*	*	*	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	55	[64]	52	*	[54]	[51]	*	*
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	47	48	46	*	[38.3]	41	59	54

Albania

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	23	*	[19]	*	*	*	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	12	[14]	12	*	[0]	[17]	*	*
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	47	48	46	*	[38.3]	41	59	54
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	46	46	46	*	[38.3]	40	59	53
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	40	*	[43]	*	*	*	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	42	[50]	40	*	[54]	[34]	*	*
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	0	0	0	0	0	0	0	0
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	29	*	[25]	*	*	*	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	17	*	[18]	*	*	*	*	*
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	2	1	2	1	2	4	1	1
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	23.9	†	22.4	23.6	22.6	22.2	23.7	†
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	95	89	98	87	100	95	100	100
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	9	13	8	7	7	8	23	11
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
			Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”						
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	61	74	49	41	49	57	70	84

Albania

Año de la encuesta: 2008-09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
41	% de hombres de 18-49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12-14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	57	62	52	42	53	53	61	69
SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15-24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	38	51	28	18	32	37	41	63
43	% de mujeres de 15-24 años que saben dónde obtener el condón	79	93	70	62	71	82	90	96
44	% de hombres de 15-24 años que saben dónde obtener el condón	88	96	82	72	83	92	95	95
45	% de mujeres de 15-49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	74	86	64	53	66	76	82	91
46	% de mujeres de 15-49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	78	88	70	62	72	78	84	94
47	% de mujeres de 15-24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	36	51	26	20	26	30	47	60
48	% de hombres de 15-24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	22	31	15	10	16	20	24	38
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15-49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	85	93	79	72	79	86	91	95
50	% de mujeres de 15-49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	63	74	55	48	56	62	69	81
51	% de hombres de 15-59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	49	57	43	38	40	49	51	64
52	% de mujeres de 15-49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	82	89	76	69	77	82	88	93
53	% de hombres de 15-49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	86	90	83	76	82	89	88	92
54	% de mujeres de 15-49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	30	18	39	49	38	30	22	10
55	% de hombres de 15-59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	36	27	45	52	45	37	32	21
CAPÍTULO 5 FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1 Información demográfica									
56	Número de niñas de 10-14 años en 2011	130,000	50,000	80,000	32,000	28,000	27,000	23,000	20,000
57	Número de niños de 10-14 años en 2011	141,000	56,000	85,000	35,000	31,000	27,000	25,000	23,000
58	Número de mujeres de 15-19 años en 2011	136,000	51,000	85,000	31,000	29,000	29,000	25,000	21,000

Albania

Año de la encuesta: 2008-09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
59	Número de hombres de 15-19 años en 2011	144,000	58,000	86,000	30,000	32,000	30,000	29,000	23,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	95	95	95	93	95	96	96	96
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	95	96	95	94	97	94	96	97
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	99	99	100	99	98	102	99	98
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	55	70	46	33	49	56	66	82
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	57	67	51	39	52	57	64	80
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	96	104	92	85	93	98	104	102
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15-19 años que escuchan radio cada semana	47	61	38	27	40	50	53	73
67	% de mujeres de 15-19 años que ven televisión cada semana	99	99	99	98	99	99	99	100
68	% de mujeres de 15-19 años que leen periódicos cada semana	44	64	31	20	28	50	60	73
69	% de mujeres de 15-19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	31	51	19	8	19	33	44	63
70	% de mujeres de 15-19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	1	1	1	2	1	1	1	0

Albania

Año de la encuesta: 2008–09	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nd = no disponible								

Bangladesh¹

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	47	36	51	56	54	49	48	33
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	*	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	86	88	77	93	91	89	84	75
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	32	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ²	16.4	17.7	16.1	15.0	15.6	16.0	17.2	18.4
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	24.1	†	23.5	21.1	22.6	23.8	24.3	†
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	24.5	†	24.3	23.0	24.5	24.7	24.3	†
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	0.4	nd	0.8	1.9	1.9	0.9	0.0	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	58	38	62	79	71	59	41	38

Bangladesh¹

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
SECCIÓN 2		Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 3		Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	32	46	28	16	22	29	39	53	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	33	45	29	17	24	30	40	50	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	8	7	13	2	5	6	12	15	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	18	21	17	8	13	22	21	27	
SECCIÓN 4		Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	56	62	54	55	55	54	54	61	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁵	86	88	85	84	85	84	88	88	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁵	90	89	91	89	90	92	90	91	

Bangladesh¹

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	36	31	38	37	39	39	38	28	
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	36	28	38	45	44	39	34	20	
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	7,788,000	1,674,000	6,114,000	1,636,000	1,503,000	1,620,000	1,503,000	1,526,000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	8,211,000	1,650,000	6,561,000	1,921,000	1,724,000	1,568,000	1,667,000	1,322,000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	7,595,000	1,770,000	5,825,000	1,063,000	1,496,000	1,656,000	1,610,000	1,762,000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	8,007,000	1,978,000	6,029,000	1,305,000	1,569,000	1,714,000	1,738,000	1,682,000	
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria ⁷	46	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria ⁷	43	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria ⁷	107	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	28	23	30	14	28	33	35	28	
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	51	77	45	26	30	45	76	79	
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	5	10	5	2	2	4	10	11	
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	2	2	2	2	0	1	4	4	
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	37	18	41	68	53	36	16	15	

Bangladesh¹

Año de la encuesta: 2007	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de Bangladesh. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan las proporciones de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente. Igualmente, solo se entrevistó a hombres casados/unidos alguna vez en Bangladesh; y se siguió los mismos pasos detallados arriba (utilizar la base de la encuesta de hogar) para arrojar la mediana de edad a la primera unión en hombres (indicador 16).								
2. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 20–24 años.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.								
6. La EDS de Bangladesh hace preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa desobedece a los ancianos, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
7. Los datos para los indicadores 60 a 65 no estaban disponibles en la EDS de Bangladesh de 2007. Por lo tanto, utilizamos los indicadores de Desarrollo del Banco Mundial del mismo año, los cuales se refieren a la matrícula escolar, y son los porcentajes de mujeres jóvenes de edad de escuela secundaria que están matriculadas en ella (indicadores 63 a 65).								
nd = no disponible; nr = no recopilado								
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables. † = menos del 50% de las personas encuestadas en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.								

Bolivia

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	30	27	36		40	35	31	28	22
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	38	39	35		29	36	38	41	41
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	76	72	88		91	88	82	73	60
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	90	89	94		92	95	94	87	89
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	7	5	10		12	11	9	4	3
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	13	14	9		10	12	15	12	12
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	39	33	52		59	50	45	33	21
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	60	59	64		66	65	54	63	58
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	15	13	18		24	16	17	15	6
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	4	3	5		6	5	4	3	3
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	52	46	69		72	71	61	53	23
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	35	27	58		59	65	43	28	13
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	18.8	19.1	18.1		17.6	18.0	18.5	18.9	†
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	21.1	21.8	19.9		19.1	19.5	20.3	20.9	†
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	2.3	2.7	1.8		1.5	1.5	1.8	2.0	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	17.1	16.9	17.4		18.1	16.7	17.2	17.1	16.7
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	23.3	23.7	22.6		21.5	23.3	23.9	23.6	24.8
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	6.2	6.8	5.2		3.4	6.6	6.7	6.5	8.1
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	56	50	66		77	60	55	48	48

Bolivia

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	79	88	61	48	72	83	90	90	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	36	45	16	10	20	33	45	56	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	70	84	40	28	49	73	86	90	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	83	92	64	53	69	89	91	96	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	60	74	32	19	43	63	75	82	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	62	75	36	23	46	63	76	84	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	24	32	9	5	14	21	30	40	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	28	35	13	11	15	26	31	45	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	89	91	87	86	88	89	90	93	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	79	86	67	62	72	81	86	88	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁶	87	92	77	73	81	88	92	94	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	16	14	20	19	21	19	15	9	

Bolivia

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5 FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN										
SECCIÓN 1 Información demográfica										
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	562,000	318,000	244,000		121,000	119,000	124,000	111,000	87,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	584,000	317,000	268,000		130,000	132,000	125,000	111,000	86,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	533,000	351,000	182,000		75,000	100,000	113,000	120,000	124,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	553,000	359,000	193,000		82,000	107,000	111,000	129,000	124,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar										
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	94	94	93		92	93	95	94	94
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	95	95	94		93	95	95	95	95
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	99	99	99		99	98	99	99	99
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	62	71	48		30	55	69	73	77
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	66	73	54		38	61	70	74	83
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	95	97	88		77	90	100	99	93
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación										
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	91	91	90		84	92	91	93	91
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	81	96	52		19	71	93	97	97
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	42	53	22		13	26	40	53	64
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	36	47	14		4	18	37	49	57
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	3	1	6		12	2	1	1	1

Bolivia

Año de la encuesta: 2008	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

NOTAS	
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.	
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.	
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).	
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.	
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.	
6. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.	
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.	
nr = no recopilado	
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.	
[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.	

Colombia¹

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	50	50	51	51	54	52	48	43
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	91	90	92	92	93	93	89	86
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	14	13	17	19	17	13	12	7
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	61	60	66	67	69	63	58	50
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	17	15	25	28	25	16	11	5
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	52	48	70	73	67	57	41	26
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ²	17.6	17.7	17.2	16.9	17.3	17.5	17.8	18.1
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ²	21.4	22.2	19.3	18.8	19.9	20.8	22.8	26.5
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ²	3.8	4.5	2.1	1.9	2.6	3.3	5	8.4
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	25	24	31	34	25	23	23	21

Colombia¹

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	6.5	6.6	6.0	5.8	6.4	6.6	6.7	6.8	
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	65	66	61	56	62	65	66	70	
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	61	61	60	51	67	63	65	[63]	
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	59	60	54	45	56	57	62	66	
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	55	55	54	45	60	59	59	[60]	
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	6	6	7	11	5	8	4	5	
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	6	6	6	6	7	4	6	[3]	
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	32	32	33	40	33	30	31	29	
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	20	20	20	24	16	20	17	[25]	
SECCIÓN 3	Maternidad									
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	16	14	22	24	23	15	11	6	
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ²	21.4	22.0	19.8	19.1	20.2	21.3	22.4	27.8	
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	96	98	90	89	97	99	99	98	
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	62	65	57	56	62	67	64	74	
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									

Colombia¹

Año de la encuesta: 2010	Nacional		Residencia			Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS										
1. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres, con excepción de los datos de población y de asistencia escolar.										
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.										
3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).										
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.										
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.										
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.										
nr = no recopilado; nd = no disponible										
[]= Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.										

Egipto^{1,2}

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	13.0	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	54.0	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ³	21.2	22.9	20.1		19.2	20.1	20.7	21.8	23.5
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									

Egipto^{1,2}

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	41	45	40	50	38	36	38	43
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.4	4.8	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5	5.1
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	23	32	21	22	19	27	26	30
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	20	29	17	16	18	24	22	25
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	4	2	4	6	1	3	5	5
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	8	7	8	10	8	10	4	3
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	6	4	7	8	7	6	5	3
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ³	22.9	24.5	21.7	21.0	21.9	22.3	23.3	†
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	73	88	67	58	68	76	88	92

Egipto^{1,2}

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁵	39	28	48	63	51	41	29	16
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	3,985,000	1,606,000	2,379,000	980,000	821,000	745,000	733,000	709,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	4,160,000	1,598,000	2,563,000	1,036,000	878,000	811,000	732,000	707,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	3,839,000	1,547,000	2,292,000	810,000	837,000	752,000	729,000	714,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	3,981,000	1,652,000	2,329,000	912,000	900,000	764,000	693,000	713,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	88	88	88	82	90	90	91	89
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	89	89	89	87	90	91	91	88
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	98	99	98	94	99	99	99	101
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	64	69	60	49	61	68	69	75
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	67	69	66	59	63	69	72	77
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	95	100	91	83	97	98	97	97
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	44	39	45	37	39	53	50	50
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	96	95	96	88	99	96	100	100
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	3	5	2	1	2	2	4	10
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	2	5	1	0	1	2	4	9

Egipto^{1,2}

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	3	5	3	9	1	1	0	0

Egipto^{1,2}

Año de la encuesta: 2008	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de Egipto. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan las proporciones de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente.								
2. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS principal de Egipto, aunque sí se les entrevistó en la encuesta adicional sobre asuntos especiales de la salud, de modo que están disponibles los datos masculinos para el indicador 48, y los para los indicadores de población y asistencia escolar.								
3. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 25–29 años.								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado; nd = no disponible † = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.								

Etiopía

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	25	15	29	35	27	33	20	16
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	8	10	7	7	2	10	8	11
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	73	60	78	87	86	75	70	61
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	44	42	45	48	46	41	44	44
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	11	6	13	16	14	14	10	5
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	1	1	1	1	1	2	2	1
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	39	24	45	54	49	44	36	25
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	13	13	13	11	11	13	16	13
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	23	10	28	34	27	31	19	11
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	2	1	3	3	2	4	3	1
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	68	49	76	86	84	72	67	50
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	28	10	33	39	37	35	26	12
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	17.4	18.3	17.2	17.2	16.8	17.5	17.4	18.1
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	17.4	18.7	17.0	16.9	16.7	17.3	17.1	18.6
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ^{1,2}	0.0	0.4	-0.2	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	0.5
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	21.8	21.2	21.9	20.8	21.7	22.3	23.8	21.4
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	23.9	†	23.1	21.6	22.4	23.4	24.8	†
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	2.1	nd	1.2	0.8	0.7	0.4	1.0	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	57	27	68	80	71	65	55	29

Etiopía

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	54	68	49	42	50	47	55	68
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	76	77	76	71	74	79	80	77
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	33	66	21	13	19	18	27	66
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	43	76	30	21	28	29	39	75
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	74	95	67	53	65	69	76	94
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	56	77	49	42	47	50	55	77
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	65	73	62	57	61	61	67	74
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	24	38	19	12	15	21	22	39
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	34	49	30	21	28	33	34	48
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	74	87	72	68	72	70	77	85
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	62	76	59	52	58	60	62	74
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	72	85	70	66	68	69	72	81
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	69	86	63	54	61	64	69	87
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	88	96	86	81	85	87	90	96
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	68	46	76	81	78	76	71	46

Etiopía

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	45	25	50	57	54	51	43	25
CAPÍTULO 5 FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1 Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	5,497,000	599,000	4,898,000	1,160,000	1,121,000	1,088,000	1,088,000	1,039,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	5,539,000	543,000	4,996,000	1,113,000	1,130,000	1,124,000	1,163,000	1,014,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	4,948,000	1,044,000	3,904,000	693,000	876,000	920,000	925,000	1,529,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	4,964,000	755,000	4,210,000	869,000	834,000	874,000	1,122,000	1,266,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	65	82	62	53	57	63	72	82
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	64	86	60	51	59	61	68	86
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	102	95	103	103	97	103	105	96
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	13	36	6	3	4	4	13	34
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	14	44	7	3	2	5	14	41
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	96	83	89	100	182	93	94	85
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	26	41	20	8	14	22	34	41
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	18	47	8	4	4	6	10	50
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	9	13	8	2	7	6	14	13
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	2	6	1	0	1	0	1	7
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	62	35	71	86	77	70	57	34

Etiopía

Año de la encuesta: 2011	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Debido a problemas con la calidad de los datos (datos no proporcionados o estimaciones erradas de las fechas a la primera relación sexual o a la primera unión), algunos de los valores parecen ser negativos. Sin embargo, se los deben interpretar como ceros, lo que quiere decir que para estos subgrupos mujeres, es probable que el momento de su primera relación coincida con el de su primera unión.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.								
4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
<p>nd = no disponible</p> <p>† = menos del 50% de las personas de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.</p> <p>* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.</p> <p>[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.</p>								

Filipinas¹

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	14	11	16	23	17	15	11	8
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	56	47	70	83	73	59	53	35
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	2	2	2	6	3	2	1	1
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	17	14	22	37	26	15	11	10
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	11	9	14	22	16	13	8	4
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	49	39	63	80	68	53	45	24
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ²	21.3	21.9	20.6	19.0	20.1	21.1	22.8	24.0
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ²	22.1	23.0	20.9	19.4	20.7	21.6	23.9	+
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ²	0.8	1.1	0.3	0.4	0.6	0.5	1.1	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	21.1	20.9	21.4	20.9	22.7	20.8	20.7	20.8
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	25.2	25.9	24.3	22.8	25.3	25.0	26.1	26.6
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	4.1	5.0	2.9	1.9	2.6	4.2	5.4	5.8
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	24	19	29	55	25	19	14	17

Filipinas¹

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.2	4.3	4.1	3.2	4.1	4.3	4.5	4.6
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	[31]	*	*	*	*	*	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	26	28	24	17	26	28	[35]	*
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	[4]	*	*	*	*	*	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	14	13	15	11	14	15	[20]	*
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	[27]	*	*	*	*	*	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	12	15	9	6	11	13	[15]	*
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	[57]	*	*	*	*	*	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	36	41	32	35	33	40	[41]	*
SECCIÓN 3 Maternidad									
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	7	6	9	14	9	8	6	3
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ²	23.1	24.0	22.0	20.6	21.7	22.6	24.9	†
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	38	51	26	8	34	45	56	[72]

Filipinas¹

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	30	34	27	24	26	31	39	41
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	36	39	32	24	34	38	40	39
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	65	69	59	42	59	65	73	74
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	59	62	55	45	54	59	64	66
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	77	81	71	62	73	77	82	85
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	21	23	17	14	15	19	24	26
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	94	95	92	90	93	95	95	96
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{6,7}	84	86	83	80	84	86	85	86

Filipinas¹

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ^{7,8}	95	95	94	93	93	95	95	96
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁹	14	12	17	21	19	15	12	8
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	5,213,000	2,377,000	2,836,000	1,267,000	1,168,000	980,000	949,000	845,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	5,457,000	2,396,000	3,061,000	1,342,000	1,261,000	1,108,000	944,000	802,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	4,812,000	2,651,000	2,161,000	703,000	890,000	914,000	1,039,000	1,266,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	5,025,000	2,462,000	2,563,000	995,000	1,010,000	1,131,000	935,000	960,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria ⁷	85	88	83	75	85	90	90	91
61	% de niños que asisten a la escuela primaria ⁷	81	84	79	69	79	85	89	90
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria ⁷	105	105	106	110	107	108	101	101
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria ⁷	64	69	59	36	60	70	77	73
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria ⁷	50	59	42	22	35	58	65	79
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria ⁷	129	117	142	162	170	119	120	93
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	70	71	68	54	69	72	74	73
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	88	93	81	52	86	94	97	96

Filipinas¹

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	34	41	24	14	23	37	39	45
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	26	32	18	7	17	28	32	36
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	6	2	11	28	6	2	1	1

Filipinas¹

Año de la encuesta: 2008	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. A los hombres que participaron en las EDS de Filipinas, se les otorgó una versión resumida de la entrevista; por lo que solo se dispone de datos limitados para los hombres.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
4. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
7. Los datos para los indicadores 50, 52 y 60 a 65, no estaban disponibles en la EDS de Filipinas de 2008. Por lo tanto, los datos proporcionados provienen de la EDS para Filipinas de 2003.								
8. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.								
9. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado; nd = no disponible † = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad. * = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables. [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								

Ghana

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	44	33	55	66	56	49	37	22	
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	39	26	47	56	47	41	26	24	
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.7	5.0	4.4	3.6	4.5	4.7	4.9	5.4	
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	42	50	36	[9]	[43]	[38]	[57]	*	
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	14	[29]	7	[0]	[10]	*	*	*	
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	50	59	43	31	48	54	49	71	
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	28	31	25	[9]	[35]	[17]	[39]	*	
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	8	[10]	7	[0]	[10]	*	*	*	
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	43	49	37	27	41	44	43	58	
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	39	46	32	22	33	41	41	53	
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	14	19	11	[0]	[8]	[22]	[18]	*	
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	6	[19]	0	[0]	[0]	*	*	*	
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	8	10	5	4	6	10	6	13	
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	52	46	56	[85]	[45]	[58]	[40]	*	
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	62	[57]	64	[45]	[77]	*	*	*	
SECCIÓN 3 Maternidad										
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	10	9	11	15	13	11	10	3	
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ⁴	21.1	22.6	19.9	19.5	20.3	20.7	22.6	†	
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	57	75	45	17	62	63	[75]	*	

Ghana

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	56	62	53	36	61	69	52	80
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	53	59	48	44	46	54	55	61
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	56	57	55	54	51	56	55	62
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	30	32	27	19	30	34	30	32
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	74	86	61	43	62	79	81	90
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	87	94	81	70	83	91	92	95
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	76	79	73	63	77	77	81	78
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	85	88	82	78	83	86	88	90
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	28	34	22	17	22	30	33	34
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	34	42	28	23	27	31	38	50
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	69	72	66	63	66	69	74	72
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	63	66	60	47	61	66	68	68
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	64	67	62	60	62	64	66	69

Ghana

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	87	92	83		72	84	88	93	94
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	93	94	93		91	91	94	95	94
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	37	29	44		52	44	38	32	23
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	21	17	25		33	25	25	17	12
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	1,373,000	612,000	761,000		255,000	273,000	277,000	294,000	273,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	1,441,000	558,000	884,000		344,000	300,000	301,000	257,000	239,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	1,268,000	607,000	660,000		208,000	238,000	269,000	262,000	290,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	1,330,000	558,000	771,000		278,000	269,000	277,000	258,000	249,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	74	80	71		60	72	78	82	84
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	73	81	69		58	72	75	82	88
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	101	98	103		103	99	104	99	96
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	42	51	35		19	36	40	52	59
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	42	53	34		24	34	43	51	63
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	101	96	102		79	106	92	103	94
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	74	80	68		51	70	80	78	83
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	62	80	45		20	41	65	77	92
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	26	37	15		8	14	19	33	46
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	19	31	8		5	8	14	27	39

Ghana

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	15	7	23	42	21	10	8	4

Ghana

Año de la encuesta: 2008	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. Se calculó la mediana a base de las mujeres de 30–34 años.								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
<p>nd = no disponible</p> <p>† = menos del 50% de las mujeres en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad (25–29 años para primera relación sexual/unión y 30–34 años para primer nacimiento).</p> <p>* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.</p> <p>[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.</p>								

Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	28	24	31	33	35	28	26	15
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales ¹	40	42	39	35	38	36	50	41
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	36	37	36	29	39	41	40	32
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales ¹	89	90	87	84	93	90	93	86
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	8	6	10	13	11	9	6	2
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años ¹	20	22	18	17	24	22	17	18
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	38	32	43	46	45	42	35	19
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años ¹	60	61	59	60	61	54	69	49
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	22	18	25	29	29	20	20	9
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos ¹	6	3	8	14	7	3	4	2
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	60	52	65	71	65	64	64	33
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos ¹	44	38	49	49	54	47	35	24
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ²	18.4	19.0	18.0	17.2	18.2	18.1	18.7	20.4
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ²	19.4	20.7	18.5	17.6	18.9	18.8	19.9	22.8
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ²	1	1.7	0.5	0.4	0.7	0.7	1.2	2.3
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	17	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	23	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses ¹	52	48	55	52	53	48	58	48

Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH ¹	79	88	72		56	67	83	93	95
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH ¹	87	94	82		68	83	94	98	98
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón ¹	73	82	67		46	64	85	89	97
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	74	86	64		43	64	80	90	92
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	85	93	79		63	81	91	96	97
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	22	32	14		5	13	21	32	41
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ^{1,6}	19	25	14		5	13	12	39	30
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	43	59	31		21	31	38	57	76
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr

Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	7	3	10	12	11	7	3	1
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	920,000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	938,100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	821,900	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	823,100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria ⁸	86	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	% de niños que asisten a la escuela primaria ⁸	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria ⁸	96	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria ⁸	39	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria ⁸	41	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria ⁸	95	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	76	78	74	59	76	82	82	81
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	75	89	63	20	68	89	97	98
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	74	83	67	52	68	78	85	89
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	50	63	40	10	42	59	69	70
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	5	2	8	21	6	1	0	0

Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09	Nacional	Residencia	Quintil de riqueza					
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Los archivos de datos para los hombres jóvenes a nivel de subgrupo no estaban disponibles en la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 2008–09, de modo que los datos de los datos completos (nivel nacional y nivel de subgrupo) para los indicadores 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 27, 28, 31, 44 y 48 provienen de la ENSMI de 2002. Igualmente, debido a la falta de datos en 2008–09 para ambas mujeres y hombres jóvenes, los indicadores 19, 20, 40 y 41 provienen de la ENSMI de 2002.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.								
4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. El cuestionario utilizado en la encuesta de 2002 hizo preguntas algo distintas que las de la encuesta de 2008–09. Por lo tanto, el indicador 48 combina las siguientes respuestas: saber que no existe cura para el SIDA; saber que usar condones reduce el riesgo de contraer el virus; saber por lo menos una de las siguientes formas de evitar el virus—tener una sola pareja, no tener relaciones con mujeres que tienen otras parejas y no tener relaciones sexuales con desconocidas; y saber que una persona infectada puede parecer saludable.								
7. El cuestionario utilizado en las encuestas realizadas por los CDC no indaga sobre las cinco razones comparables que justifica la violencia contra la mujer. Sin embargo, el indicador 54 presenta datos semejantes—las proporciones de mujeres que están de acuerdo con que "hay situaciones en que un hombre tiene derecho a pegarle a su esposa/compañera".								
8. Los datos para los indicadores 60 a 65 no estaban disponibles en las encuestas llevadas a cabo por los CDC en Guatemala. Por lo tanto, utilizamos los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial para el año 2008, los cuales se refieren a la matrícula escolar, y son los porcentajes de jóvenes de edad de escuela primaria y secundaria que están matriculados en ellas.								

Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09	Nacional		Residencia			Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

nr = no recopilado; nd = no disponible
 * = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.
 [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

Honduras¹

Año de la encuesta: 2005–06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	44	51	35		27	32	44	50	57
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	76	84	67		58	66	77	82	90
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	70	72	68		63	67	74	73	72
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	89	91	86		80	87	90	91	93
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	30	37	22		13	19	31	35	43
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	81	86	75		70	73	80	87	91
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	84	86	83		78	83	84	86	87
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	48	50	47		40	45	52	52	50
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr

Honduras¹

Año de la encuesta: 2005–06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	16	11	21	27	23	16	11	7
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	444,407	195,000	249,000	94,000	97,000	92,000	84,000	79,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	461,615	195,000	267,000	103,000	104,000	96,000	82,000	77,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	429,279	230,000	199,000	65,000	76,000	94,000	97,000	97,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	441,883	205,000	237,000	90,000	93,000	92,000	83,074	82,632
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	89	91	87	82	88	91	94	93
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	86	89	84	78	85	87	91	93
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	103	102	104	106	103	104	103	100
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	42	59	25	9	21	38	59	76
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	34	54	19	7	13	32	52	78
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	124	110	134	120	159	116	114	97
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	91	90	93	92	92	90	90	93
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	72	93	48	13	46	84	95	97
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	45	57	31	18	29	43	55	67
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	37	51	20	3	16	36	49	62
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	2	1	4	7	4	2	1	0

Honduras¹

Año de la encuesta: 2005–06	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

NOTAS
1. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres.
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.
3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.
nr = no recopilado; nd = no disponible * = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables. [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

India

Año de la encuesta: 2005–06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	28	15	34	43	38	29	21	10
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	11	7	14	17	16	11	9	6
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	76	61	83	93	88	80	72	53
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	44	31	53	67	60	47	37	24
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	10	4	13	20	16	10	5	1
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	2	1	3	5	3	2	2	1
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	40	24	48	64	57	45	30	14
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	12	6	15	23	16	13	8	4
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	28	15	33	42	38	29	21	10
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	3	1	4	6	5	3	1	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	75	61	82	93	88	79	71	52
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	33	19	41	57	47	34	26	13
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	18.0	19.6	17.3	16.3	16.8	17.5	18.6	21.1
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	17.4	19.2	16.6	15.4	16.0	16.8	18.2	20.9
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ^{1,2}	-0.6	-0.4	-0.7	-0.9	-0.8	-0.7	-0.4	-0.2
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	22.7	24.8	21.6	20.2	20.7	21.9	24.0	26.2
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	23.1	25.2	22.0	20.5	21.1	22.3	24.4	26.7
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	39	22	46	65	51	38	25	15

India

Año de la encuesta: 2005–06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	20	14	24	40	27	19	14	9
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	3.9	4.2	3.8	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	[31]	*	*	*	*	*	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	13	16	12	10	12	14	16	21
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente algún método anticonceptivo	25	32	23	15	23	22	33	42
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	[18]	*	*	*	*	*	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	7	11	6	5	6	7	10	14
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	18	26	15	10	14	15	26	36
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente condón	12	21	9	4	8	9	18	31
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	[14]	*	*	*	*	*	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	6	5	6	5	6	7	5	8
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	7	6	7	5	9	7	7	6
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	[20]	*	*	*	*	*	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	27	26	27	26	27	28	27	28
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	12	6	15	19	17	13	8	3
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	19.9	21.5	19.4	18.3	18.8	19.4	20.4	23.0
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	41	64	35	20	31	46	62	82
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	14	15	13	12	14	15	13	16

India

Año de la encuesta: 2005–06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH ⁵	28	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH ⁵	35	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	12	14	11	8	10	11	14	19	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	46	57	41	31	37	41	52	67	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	85	91	81	69	79	85	91	93	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	36	56	27	9	17	30	47	70	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	45	65	35	13	25	39	58	78	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁶	20	33	14	4	7	15	26	45	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁶	36	47	29	15	24	32	44	55	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	62	69	59	59	58	60	64	70	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁷	68	73	65	62	64	65	69	76	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁷	70	75	67	59	66	68	73	81	

India

Año de la encuesta: 2005–06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁸	78	81	76	74	76	76	79	84
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁸	82	86	79	70	77	81	85	90
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁹	54	44	59	62	62	61	54	37
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁹	42	33	47	53	50	48	39	25
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	58,632,000	15,713,000	42,918,000	13,661,000	13,075,000	12,078,000	10,964,000	8,853,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	64,032,000	18,441,000	45,591,000	14,151,000	14,215,000	13,127,000	12,102,000	10,437,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	57,671,000	17,936,000	39,736,000	9,919,000	11,419,000	12,457,000	12,399,000	11,477,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	63,157,000	21,852,000	41,305,000	10,358,000	12,379,000	13,452,000	13,958,000	13,010,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	71	74	69	61	70	73	76	79
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	73	74	73	66	74	76	76	78
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	96	100	95	92	94	97	101	101
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	46	60	40	21	34	44	61	74
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	57	61	55	36	49	57	65	79
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	80	97	73	58	69	77	94	94
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	34	35	34	21	32	36	40	41
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	59	85	48	21	39	60	80	93

India

Año de la encuesta: 2005-06		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
68	% de mujeres de 15-19 años que leen periódicos cada semana	29	48	20	5	11	22	39	65
69	% de mujeres de 15-19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	13	21	9	1	5	9	18	29
70	% de mujeres de 15-19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	29	9	38	66	45	26	11	3

India

Año de la encuesta: 2005–06	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Un valor negativo del indicador 15 (la edad mediana a la primera relación es mayor a la de la primera unión) resulta de prácticas tradicionales que aún persisten en el norte de la India: los novios celebran el matrimonio a muy temprana edad, pero viven separados por varios años hasta cuando celebran otra ceremonia que señala la iniciación de la convivencia y la vida conyugal y sexual. Aunque en la EDS de India se entrevistó a mujeres que nunca han estado unidas/casadas, es probable que la edad mediana a la primera relación sexual se refiera únicamente a las mujeres unidas, debido a que en este país socialmente conservador, las mujeres solteras son reacias a admitir cualquiera actividad sexual.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
5. A diferencia del cuestionario utilizado en los otros países, en el de la EDS de India, se pidieron a los hombres y mujeres de 15–49 años si estaban de acuerdo con que se enseñe en la escuela una serie de temas (incluido el uso del condón para prevenir las ITS) a las y los estudiantes, y a qué edad se debe hacerlo por primera vez. Por lo tanto, los indicadores 40 y 41 se refieren al porcentaje de mujeres y hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que se enseñe sobre el condón a las mujeres adolescentes de 13–15 años.								
6. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
7. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
8. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.								
9. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								

India

Año de la encuesta: 2005-06	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

nd = no disponible
 *= Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.
 [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

Indonesia^{1,2}

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	8	4	10	12	10	5	5	4	
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	0	0	0	0	1	0	0	0	
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	38	28	44	50	47	34	27	21	
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	12	15	10	12	7	7	12	25	
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	13	6	20	10	10	15	25	15	
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	61	48	73	61	61	64	64	64	
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ³	20.0	21.3	19.0	18.8	19.1	19.9	20.6	22.2	
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ³	20.8	22.6	19.5	19.2	19.4	20.4	21.1	22.7	
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ³	0.8	1.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ⁴	24.5	25.2	23.7	23.1	23.5	23.7	25.1	25.5	
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ⁴	25.1	25.5	24.3	23.9	24.5	24.1	25.4	25.9	
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ⁴	0.6	0.3	0.6	0.8	1.0	0.4	0.3	0.4	
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	75	60	79	86	81	63	62	63	

Indonesia^{1,2}

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	67	59	73		82	71	70	61	52
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.5	5.2	4.3		3.8	4.3	5.0	5.3	5.1
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	47	49	46		44	50	61	32	49
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	46	48	45		42	49	59	32	49
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	1	2	1		1	0	2	1	0
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	10	10	10		9	11	4	13	17
SECCIÓN 3	Maternidad									
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	7	3	10		5	5	8	11	6
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ³	22.5	24.3	21.2		20.8	21.0	21.8	22.7	24.4
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	38	62	29		14	36	50	51	75
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	10	10	10		10	10	7	12	13
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									

Indonesia^{1,2}

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
SECCIÓN 1		Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2		Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 3		Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	24	37	17	9	19	28	32	45	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	39	59	29	18	32	42	53	72	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	36	49	26	13	24	33	45	61	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	42	56	32	17	29	41	54	69	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	10	16	6	3	6	10	14	23	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	15	19	13	2	15	12	26	27	
SECCIÓN 4		Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	85	86	84	83	83	85	86	86	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	57	60	56	52	57	58	58	61	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁷	83	87	80	74	81	83	85	91	

Indonesia^{1,2}

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁸	31	26	34		38	34	31	28	23
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁸	16	14	18		23	17	16	15	12
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	10,454,000	4,244,000	6,210,000		2,154,000	2,143,000	2,248,000	1,986,000	1,924,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	10,833,000	4,160,000	6,673,000		2,448,000	2,253,000	2,199,000	2,004,000	1,917,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	10,574,000	5,023,000	5,551,000		1,946,000	1,840,000	2,083,000	2,147,000	2,559,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	10,909,000	4,887,000	6,022,000		1,920,000	2,335,000	2,236,000	2,215,000	2,204,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	84	83	84		86	85	84	83	79
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	86	86	86		85	87	86	86	84
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	98	96	99		101	98	98	96	94
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	59	65	55		38	54	60	72	69
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	57	65	51		36	48	57	67	80
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	103	99	106		106	113	105	108	86
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	32	39	31		25	40	35	38	20
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	72	80	70		48	76	88	85	99
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	6	11	5		6	3	6	11	7
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	2	5	2		3	1	1	5	2

Indonesia^{1,2}

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	21	12	24	41	17	10	9	1

Indonesia^{1,2}

Año de la encuesta: 2007	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
<p>1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de Indonesia. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan los porcentajes de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente. Además, se entrevistó únicamente a hombres actualmente casados/unidos, y se siguieron los mismos pasos detallados arriba (utilizar la encuesta de hogares) para arrojar los datos sobre la mediana a la primera unión en los hombres (indicador 17).</p>								
<p>2. A los hombres que participaron en la EDS de Indonesia se les otorgó una versión resumida de la entrevista; por lo que solo se dispone de datos limitados para los hombres.</p>								
<p>3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.</p>								
<p>4. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.</p>								
<p>5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.</p>								
<p>6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.</p>								
<p>7. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.</p>								
<p>8. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.</p>								
nr = no recopilado; nd = no disponible								

Kenia

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	37	40	36	40	38	32	36	38
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	44	36	45	32	53	50	44	33
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	86	79	89	96	89	90	83	80
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	88	92	86	87	89	86	85	91
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	11	9	12	18	11	11	11	8
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	22	15	24	27	27	23	21	14
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	47	39	50	62	54	48	44	36
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	58	51	60	61	68	61	57	48
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	13	16	12	18	16	8	12	12
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	1	0	1	1	1	1	0	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	62	50	68	86	64	67	63	47
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	17	23	16	21	28	9	11	21
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	18.3	19.5	17.7	17.7	16.6	17.2	18.4	20.0
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	20.2	22.7	19.5	19.1	18.5	19.1	20.3	23.0
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.9	3.2	1.8	1.4	1.9	1.9	1.9	3.0
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	17.4	18.3	16.9	16.3	17.1	17.1	17.3	18.1
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	24.8	25.6	24.5	23.4	24.5	23.7	25.4	25.2
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	7.4	7.3	7.6	7.1	7.4	6.6	8.1	7.1
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	44	30	47	71	50	37	38	27

Kenia

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	61	65	60	51	61	65	62	65
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	72	73	72	65	74	71	75	72
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	40	48	37	25	33	40	45	50
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	65	75	62	47	61	66	70	76
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	84	92	82	72	86	82	85	92
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	75	81	72	58	73	76	78	83
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	92	95	90	83	90	93	93	95
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	48	57	45	29	45	47	49	61
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	55	66	52	42	49	53	59	68
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	73	76	72	63	70	75	76	80
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	52	57	51	51	49	50	52	57
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	57	64	55	45	55	55	56	66
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ^{6,7}	87	92	85	83	83	85	89	93

Kenia

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ^{6,7}	93	94	92	90	91	92	93	95
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁸	53	34	59	67	67	59	49	32
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁸	44	36	46	53	51	45	41	36
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	2,469,000	338,000	2,131,000	553,000	568,000	504,000	486,000	356,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	2,491,000	284,000	2,207,000	615,000	560,000	568,000	448,000	299,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	2,174,000	402,000	1,772,000	411,000	454,000	472,000	446,000	391,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	2,188,000	322,000	1,866,000	379,000	516,000	503,000	494,000	293,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	80	83	80	66	84	84	83	86
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	78	85	76	63	77	82	85	89
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	103	97	104	105	109	103	98	97
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	18	32	16	6	8	19	28	37
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	17	44	13	7	9	13	20	53
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	108	73	122	78	84	159	143	69
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	77	79	76	44	76	88	86	85
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	32	65	24	5	11	21	50	74
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	26	44	22	9	15	23	36	49
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	14	33	10	1	3	8	21	39

Kenia

Año de la encuesta: 2008–09		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	20	12	21	54	21	11	9	7

Kenia

Año de la encuesta: 2008–09	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Los datos para los indicadores 50–53 no estaban disponibles o estaban incompletos en la EDS de Kenia de 2008–09; los datos proporcionados son los de la EDS de Kenia de 2003.								
7. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.								
8. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado; nd = no disponible								
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.								
[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								

Malawi

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	44	41	45	49	50	45	43	36
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	54	56	54	51	55	58	56	52
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	94	88	95	96	98	98	96	84
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	87	82	89	94	90	94	88	77
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	14	11	15	18	18	14	15	9
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	22	20	23	24	26	25	19	19
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	60	50	62	65	68	64	61	43
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	53	51	54	59	52	55	54	48
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	26	19	28	31	34	31	27	13
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	3	1	3	3	2	4	2	2
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	86	72	89	93	95	94	87	65
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	41	25	46	60	48	56	41	18
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	17.4	18.1	17.2	17.1	16.9	17.0	17.3	18.5
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	18.0	19.5	17.7	17.5	17.4	17.6	18.1	†
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	0.6	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	18.5	18.5	18.5	18.3	18.8	18.3	18.2	18.7
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	22.3	24.0	21.9	21.4	21.8	21.7	22.4	†
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	3.8	5.5	3.4	3.1	3	3.4	4.2	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	48	39	50	65	59	49	41	32

Malawi

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	26	26	26	31	28	29	27	19
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	5.1	5.5	5.0	4.8	4.8	4.9	5.0	5.7
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	25	52	17	9	17	17	30	41
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	29	36	28	28	31	33	21	31
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	44	50	43	41	38	42	46	54
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	24	49	16	7	14	17	28	40
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	26	34	25	24	28	30	20	29
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	42	49	40	38	34	40	46	52
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	33	42	32	25	26	27	40	48
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	1	3	1	2	2	0	2	1
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	2	2	3	4	3	3	0	2
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	2	1	3	3	4	2	1	2
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	67	46	73	72	72	75	66	58
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	25	28	24	23	19	27	32	23
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	20	16	21	25	25	23	18	13
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	18.9	19.8	18.8	18.5	18.5	18.7	18.8	†
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	81	88	79	77	73	78	87	92
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	35	45	34	33	31	35	38	45

Malawi

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	58	63	57	53	57	57	59	63	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	64	68	62	57	63	64	62	69	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	51	54	50	46	51	50	53	52	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	79	82	78	74	77	77	80	84	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	89	89	89	85	89	90	87	92	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	72	76	71	69	70	71	74	75	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	87	89	86	84	85	86	87	90	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	42	56	38	34	35	38	44	55	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	45	54	42	35	41	40	46	54	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	55	70	52	48	49	52	58	68	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	53	62	51	50	51	50	52	62	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	55	65	53	50	50	52	53	66	

Malauí

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	85	90	84	81	83	84	87	90
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	91	95	89	86	89	90	91	94
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	13	10	13	15	13	14	11	10
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	13	8	14	16	14	13	13	10
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	970,000	147,000	823,000	201,000	187,000	185,000	200,000	197,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	987,000	151,000	836,000	199,000	195,000	189,000	193,000	209,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	853,000	164,000	689,000	143,000	147,000	160,000	180,000	222,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	863,000	156,000	707,000	161,000	157,000	152,000	178,000	217,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	92	95	91	84	90	92	95	98
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	90	96	89	82	87	91	92	97
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	102	98	102	102	103	102	103	100
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	13	30	9	3	5	7	12	31
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	12	28	9	3	4	7	13	29
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	108	108	106	88	138	109	98	105
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	58	66	57	39	47	57	67	74
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	21	48	14	6	8	12	13	53
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	17	26	15	11	11	13	14	31

Malawi

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	7	16	4		2	2	3	4	19
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	35	21	38		55	47	37	29	13

Malawi

Año de la encuesta: 2010	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Los datos para los indicadores 50 y 51 no estaban disponibles o estaban incompletos en la EDS de Malawi de 2010; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Malawi, la de 2004.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nd = no disponible † = menos del 50% de las personas encuestadas en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.								

Moldavia

Año de la encuesta: 2005		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	48	45	50	55	51	50	45	40
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	70	68	71	76	73	67	66	69
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.3	4.7	4.0	3.7	3.9	4.3	4.4	5.0
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	66	62	[69]	*	*	*	[73]	[65]
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	58	58	59	*	[57]	[46]	[47]	*
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	46	48	[44]	*	*	*	[47]	[54]
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	29	37	26	*	[35]	[28]	[29]	*
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	20	14	[25]	*	*	*	[26]	[11]
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	29	21	33	*	[22]	[19]	[18]	*
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	32	35	[29]	*	*	*	[27]	[32]
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	13	20	9	*	[8]	[21]	[17]	*
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	5	3	6	8	9	6	2	1
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	22.3	23.8	21.4	20.7	21.3	22.0	22.2	24.3

Moldavia

Año de la encuesta: 2005		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	100	100	100	[100]	[100]	[100]	*	*
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	22	28	19	15	25	22	27	24
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	73	82	66	50	63	73	80	86
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	85	91	81	68	82	88	88	93
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	90	97	85	78	85	90	95	99
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	95	99	92	85	95	97	96	98
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	78	85	73	59	72	80	84	90
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	81	87	77	64	77	82	87	91
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	42	51	35	21	31	43	48	56
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	54	63	48	24	49	64	61	66
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	97	96	98	97	98	97	97	97

Moldavia

Año de la encuesta: 2005		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	71	73	70	69	71	73	70	73	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	68	69	67	61	65	73	71	69	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	91	94	88	82	87	92	93	96	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	94	97	93	88	94	94	96	98	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	21	14	26	38	27	20	15	10	
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	22	15	27	32	27	23	17	13	
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	94,000	29,000	65,000	20,000	20,000	22,000	19,000	13,000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	96,000	28,000	68,000	24,000	20,000	22,000	17,000	13,000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	133,000	51,000	82,000	26,000	22,000	29,000	29,000	27,000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	135,000	54,000	81,000	25,000	23,000	29,000	29,000	30,000	
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	84	80	86	88	86	85	82	76	
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	84	81	85	88	80	83	89	76	
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	100	99	101	101	106	102	92	100	
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	79	75	81	80	83	79	80	71	
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	80	74	83	83	82	84	80	69	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	99	102	97	97	102	94	100	103	

Moldavia

Año de la encuesta: 2005		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	84	83	85	82	84	83	85	87
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	93	96	91	82	92	97	94	99
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	60	64	58	50	56	63	64	68
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	52	54	51	39	48	57	56	61
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	2	1	2	5	3	1	1	0

Moldavia

Año de la encuesta: 2005	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado								
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.								
[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								

Mozambique

Año de la encuesta: 2003		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	73	70	77	80	73	74	78	67
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	69	74	63	61	60	68	66	78
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	98	98	99	99	98	99	99	97
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	97	98	96	96	100	95	98	98
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	28	21	33	34	35	32	30	16
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	26	25	28	22	34	31	29	22
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	81	77	84	84	82	82	84	77
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	72	74	70	74	61	68	75	76
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	43	28	57	68	54	53	43	20
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	6	4	7	13	9	8	3	3
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	84	72	92	92	91	95	87	63
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	52	36	69	83	72	64	35	32
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	16.0	16.6	15.7	15.8	15.7	15.8	16.1	16.8
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	17.5	18.9	16.8	16.7	16.8	17.0	17.6	19.9
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.5	2.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	3.1
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	17.3	17.8	17.2	17.6	17.2	16.9	16.9	17.7
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	21.8	22.8	21.5	21.4	22.4	20.8	22.0	23.3
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	4.5	5	4.3	3.8	5.2	3.9	5.1	5.6
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	55	44	64	71	65	59	50	43

Mozambique

Año de la encuesta: 2003		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	62	62	62	64	50	60	71	61
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	3.1	3.6	2.5	2.1	2.4	2.5	3.4	3.9
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	44	55	24	[4]	[20]	18	35	65
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	20	24	19	15	19	23	20	26
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	30	44	14	5	6	19	37	50
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	41	51	23	[4]	[20]	18	30	61
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	7	15	3	0	2	4	12	21
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	30	43	14	5	6	18	37	49
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	26	37	12	5	6	15	28	44
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	4	2	[0]	[0]	0	4	3
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	13	8	15	15	17	18	9	5
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	1	1	0	1	0	1	0	1
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	37	34	43	[40]	[44]	51	46	27
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	17	22	15	11	12	15	24	27
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	34	27	41	49	38	41	36	20
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	18.6	19.3	18.2	18.0	18.2	18.4	18.5	19.7
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	57	86	40	28	40	49	78	91
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	23	41	13	7	13	14	38	48

Mozambique

Año de la encuesta: 2003		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	62	74	56	48	56	60	69	81
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	66	70	63	56	57	71	67	76
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	57	75	44	32	43	51	64	82
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	83	90	74	64	68	77	92	93
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	53	69	44	33	40	50	61	80
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	53	64	46	39	44	52	56	71
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	20	31	12	8	10	14	23	36
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	38	39	36	36	29	39	41	39
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	61	59	63	68	61	63	57	56
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	45	45	44	46	43	43	43	48
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	40	40	40	45	31	41	41	41
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	71	81	65	60	62	67	78	86

Mozambique

Año de la encuesta: 2003		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	80	87	75	74	65	81	89	89
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	54	48	58	53	59	59	57	45
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	42	42	42	42	46	40	43	39
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	1,510,456	534,701	975,755	268,861	296,049	309,643	297,560	338,342
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	1,514,065	489,043	1,025,022	280,102	301,299	313,411	334,608	283,130
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	1,278,054	586,627	691,427	214,713	182,762	208,323	283,728	388,528
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	1,274,631	592,703	681,928	159,329	205,216	233,257	294,440	381,115
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	57	75	48	39	44	49	68	87
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	63	76	57	52	51	57	72	88
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	90	98	84	76	86	87	95	99
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	7	14	1	0	1	0	3	21
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	8	18	2	1	2	4	7	23
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	80	77	61	8	63	11	51	91
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	53	67	40	22	35	51	57	75
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	24	47	4	2	2	4	16	62
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	6	12	1	0	1	1	5	16
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	4	8	0	0	0	0	1	12

Mozambique

Año de la encuesta: 2003		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	42	23	59	78	64	48	40	12

Mozambique

Año de la encuesta: 2003	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								

Nepal

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	29	18	31	33	34	39	25	14
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	21	20	21	23	25	26	17	16
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	78	61	80	90	85	80	81	59
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	68	49	72	81	76	77	69	49
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	7	4	7	10	7	9	6	2
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	3	1	3	3	3	5	3	2
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	39	24	42	55	48	49	35	17
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	24	18	26	37	28	33	20	14
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	29	16	31	33	33	39	25	13
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	7	5	7	10	8	14	4	2
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	77	61	80	89	85	79	81	59
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	46	29	50	74	56	62	37	23
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	19.0	†	18.7	17.4	17.9	18.3	19.2	†
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	18.9	†	18.7	17.2	17.8	18.3	19.2	†
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ^{1,2}	-0.1	nd	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	20.6	22.7	20.1	19.2	19.7	19.8	20.8	22.8
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	22.1	24.5	21.6	19.5	20.4	22.0	22.1	†
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	1.5	1.8	1.5	0.3	0.7	2.2	1.3	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	32	21	34	47	39	36	24	16

Nepal

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	24	19	24	31	29	27	19	16
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	6.2	6.4	6.2	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	*	*	*	*	*	*	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	18	30	17	14	18	13	23	28
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente algún método anticonceptivo	45	63	43	38	40	35	60	58
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	*	*	*	*	*	*	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	14	26	14	12	12	11	20	27
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	41	58	38	34	37	31	52	55
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente condón	29	43	27	22	21	24	36	44
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	*	*	*	*	*	*	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	3	3	1	6	2	4	1
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ⁴ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	4	4	5	4	3	4	7	3
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ⁴ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	*	*	*	*	*	*	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	41	28	43	40	42	48	31	44
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	12	6	13	13	16	16	11	5
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ⁵	20.1	21.2	19.9	19.1	19.3	19.8	20.4	21.8
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	47	80	44	25	39	52	52	86

Nepal

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	24	23	24	16	26	26	26	27
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	37	39	36	31	34	32	41	43
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	85	87	85	77	82	87	88	90
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	97	96	97	93	96	97	98	97
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	74	85	73	60	66	71	81	89
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	79	88	77	66	71	75	85	93
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁶	26	40	24	8	16	20	33	48
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁶	34	42	32	20	21	25	25	42
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	65	73	64	59	62	62	66	77
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{7,8}	83	84	83	81	82	80	86	85

Nepal

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{7,8}	80	75	81	73	83	81	80	80
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	93	95	93	85	90	93	97	98
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	96	97	95	92	94	96	97	98
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ^{8,9}	23	27	23	28	24	22	20	23
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ^{8,9}	21	20	22	26	23	22	20	19
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	1,782,000	208,000	1,573,000	412,000	390,000	340,000	342,000	298,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	1,881,000	258,000	1,623,000	399,000	387,000	391,000	363,000	339,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	1,645,000	242,000	1,403,000	288,000	337,000	349,000	360,000	311,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	1,735,000	349,000	1,386,000	234,000	316,000	357,000	408,000	422,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	86	93	85	82	82	88	89	94
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	92	95	92	86	91	93	96	98
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	94	98	93	95	90	95	93	97
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	58	71	56	41	48	59	69	79
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	59	71	58	46	52	59	65	76
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	98	101	97	90	91	99	107	104
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	55	55	55	49	56	56	59	53
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	52	83	48	11	29	52	78	90

Nepal

Año de la encuesta: 2011		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	18	46	13	3	6	9	25	48
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	11	26	8	1	4	6	17	27
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	24	7	27	46	35	24	13	5

Nepal

Año de la encuesta: 2011	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.								
2. Un valor negativo del indicador 15 (la edad mediana a la primera relación es mayor a la de la primera unión) resulta de prácticas tradicionales que aún persisten en algunos grupos étnicos de Nepal: los novios celebran el matrimonio a muy temprana edad, pero viven separados hasta cuando celebran otra ceremonia que señala la iniciación de la convivencia y la vida conyugal y sexual. Aunque se entrevistó a mujeres que nunca han estado unidas/casadas, es probable que la edad mediana a la primera relación sexual se refiera únicamente a las mujeres unidas, debido a que en este país socialmente conservador, las mujeres solteras son reacias a admitir cualquiera actividad sexual.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.								
4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
5. Se calculó la mediana a base de las mujeres de 25–29 años.								
6. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
7. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
8. Los datos para los indicadores 50, 51, 54 y 55 no estaban disponibles en la EDS de Nepal de 2011; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Nepal, la de 2006.								
9. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado; nd = no disponible † = menos del 50% de las mujeres en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad. * = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.								

Nigeria

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	46	31	54	73	59	44	39	22
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	22	19	24	21	18	23	23	24
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	86	79	89	96	93	87	83	74
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	62	62	62	58	59	59	64	66
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	16	8	20	30	25	15	10	5
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	6	5	6	6	4	7	6	6
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	49	34	58	73	67	50	39	25
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	26	23	27	23	25	26	29	24
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	29	13	38	65	45	24	16	5
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	1	0	1	4	1	0	0	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	62	45	71	89	83	65	49	36
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	16	8	21	37	24	15	9	5
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes	18.1	19.8	16.9	15.7	16.0	17.6	19.0	20.4
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	19.3	22.6	17.5	15.6	16.1	18.3	21.2	24.1
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ^{1,2}	1.2	2.8	0.6	-0.1	0.1	0.7	2.2	3.7
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ³	20.6	20.5	20.6	20.8	21.2	20.6	20.3	20.4
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ³	26.9	+	25.1	23.3	23.9	25.5	28.9	+
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ³	6.3	nd	4.5	2.5	2.7	4.9	8.6	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	69	56	75	90	82	70	60	48

Nigeria

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	32	38	29	20	24	33	39	41	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	47	50	45	36	42	49	51	52	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	12	17	10	3	6	11	17	19	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	37	54	27	10	17	33	49	64	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	68	81	60	38	56	67	80	85	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	53	63	47	31	42	55	65	67	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	68	75	64	53	62	69	75	77	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	22	30	18	9	15	21	28	34	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	33	40	28	18	25	33	38	41	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	44	54	39	26	34	45	56	63	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	47	49	45	38	42	49	51	51	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁶	52	53	51	46	52	55	55	51	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	70	79	64	52	62	70	78	82	

Nigeria

Año de la encuesta: 2008		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	84	88	81	72	81	84	87	90	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	43	31	50	56	53	49	39	23	
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	30	24	33	37	34	34	28	20	
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	9,532,000	3,031,000	6,501,000	1,925,000	2,040,000	1,954,000	1,802,000	1,811,000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	9,936,000	3,070,000	6,866,000	2,116,000	2,037,000	2,077,000	1,928,000	1,788,000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	8,207,000	2,839,000	5,367,000	1,453,000	1,543,000	1,691,000	1,781,000	1,740,000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	8,531,000	2,926,000	5,605,000	1,501,000	1,484,000	1,843,000	1,962,000	1,740,000	
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	59	72	54	29	49	71	78	77	
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	65	76	60	37	59	76	81	78	
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	91	95	89	78	83	93	97	98	
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	46	63	38	11	27	51	64	73	
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	52	66	45	19	37	57	67	75	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	90	94	85	55	73	90	96	97	
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	54	66	47	27	41	52	67	74	
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	44	72	28	4	12	31	69	89	
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	12	20	7	1	3	9	15	27	
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	9	16	5	0	2	5	12	24	
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	36	17	47	71	55	39	19	7	

Nigeria

Año de la encuesta: 2008	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Debido a problemas con la calidad de los datos (datos no proporcionados o estimaciones erradas de las fechas a la primera relación sexual y/o a la primera unión), el valor para las mujeres más pobres parece ser negativo. Sin embargo, se lo debe interpretar como cero, lo que quiere decir que para estas mujeres, es probable que el momento de su primera relación coincida con el de su primera unión.								
3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nd = no disponible † = menos del 50% de las personas encuestadas en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.								

Pakistán^{1,2}

Año de la encuesta: 2006–07		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	16	10	19	29	22	14	12	8
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	48	38	54	71	58	46	41	36
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ³	20.3	21.6	19.6	18.1	19.0	20.3	20.9	22.7
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes	na	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	67	54	70	88	68	55	51	45

Pakistán^{1,2}

Año de la encuesta: 2006–07		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	3.7	4.0	3.6	3.3	3.4	3.9	4.2	4.3
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	7	12	5	1	4	12	11	15
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	4	9	3	1	1	6	7	13
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	3	2	0	3	6	4	2
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	20	25	19	17	19	24	18	25
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	7	5	8	11	9	6	5	3
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ³	22.7	23.9	22.1	20.7	21.5	22.7	23.2	24.6
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	36	50	30	15	27	46	47	[73]
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	10	12	9	9	9	11	10	11

Pakistán^{1,2}

Año de la encuesta: 2006–07	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
<p>1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de Pakistán. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan las proporciones de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y el sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente.</p>								
<p>2. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS de Pakistán; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres, con excepción de los datos de población y de asistencia escolar.</p>								
<p>3. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 25–29 años.</p>								
<p>4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.</p>								

Año de la encuesta continua: 2007–08		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	26	25	31		46	33	30	23	20
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	74	71	82		85	85	81	78	61
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	6	4	12		22	11	6	4	2
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	36	31	51		64	55	42	33	22
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	13	10	21		33	20	18	7	6
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	46	39	66		74	69	61	47	21
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ²	18.9	19.4	17.9		16.6	17.9	18.2	19.1	20.5
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ²	22.0	23.3	19.7		18.4	19.6	20.3	22.0	†
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ²	3.1	3.9	1.8		1.8	1.7	2.1	2.9	nd
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									

Año de la encuesta continua: 2007–08		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	44	38	60	74	59	47	34	35
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	5.6	6.1	4.3	3.5	4.2	5.5	6.1	6.5
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	54	56	41	*	47	53	49	61
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	60	62	58	49	60	61	78	[59]
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	39	42	18	*	21	17	36	55
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	40	47	32	22	34	36	71	[58]
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	15	14	23	*	25	36	13	6
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	20	15	26	27	27	24	6	[1]
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	36	33	53	*	49	32	41	29
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	18	18	17	24	15	21	10	[18]
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	11	8	17	28	16	15	7	4
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ²	22.3	23.5	20.2	18.6	20.2	21.0	22.4	†

Año de la encuesta continua: 2007–08		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	81	94	62	45	67	91	96	99
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	61	63	58	56	60	58	62	73
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"							
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional								
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	48	53	31	22	31	47	54	56
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	90	97	72	58	74	92	97	98
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	53	61	27	18	26	46	60	67
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	27	30	18	15	17	23	28	34
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	10	4	12	2	3	9	11	14
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	72	76	60	55	61	71	76	77

Año de la encuesta continua: 2007–08		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	81	84	74		67	74	83	85	84
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁶	92	95	85		78	85	93	95	96
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	1,423,000	848,000	575,000		191,000	370,000	326,000	272,000	265,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	1,473,000	869,000	604,000		209,000	382,000	314,000	293,000	276,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	1,415,000	1,010,000	405,000		106,000	276,000	307,000	320,000	406,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	1,458,000	968,000	490,000		141,000	310,000	343,000	313,000	348,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	87	85	89		93	87	81	84	88
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	85	82	90		91	89	85	79	83
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	102	104	99		102	98	96	107	106
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	63	69	51		34	63	67	73	66
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	64	71	52		44	63	65	73	70
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	99	97	98		77	100	103	101	95
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	74	76	71		61	71	75	76	77
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	65	76	37		11	36	69	78	80

Perú¹

Año de la encuesta continua: 2007–08		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	31	38	13	4	17	23	41	42
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	19	24	6	0	7	14	28	27
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	10	6	21	37	19	9	5	4

Año de la encuesta continua: 2007–08	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres, con excepción de los datos de población y de asistencia escolar.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.								
<p>nr = no recopilado; nd = no disponible</p> <p>† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.</p> <p>* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.</p> <p>[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.</p>								

República Democrática del Congo

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	52	46	60	62	62	57	53	39	
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	51	48	53	49	48	54	58	45	
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	91	86	96	96	97	93	88	85	
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	91	88	94	92	91	92	93	87	
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	18	13	23	24	24	19	18	9	
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	18	16	19	20	18	16	21	15	
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	61	55	67	70	69	66	60	46	
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	56	54	57	60	52	58	53	56	
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	25	20	30	31	35	28	27	11	
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	6	8	5	3	8	4	13	5	
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	73	59	84	83	88	82	74	41	
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	33	28	37	45	48	35	27	17	
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	17.0	17.7	16.6	16.5	16.4	16.9	17.1	18.3	
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	19.1	†	18.4	18.3	18.6	18.2	18.7	†	
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	2.1	nd	1.8	1.8	2.2	1.3	1.6	nd	
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	18.0	18.4	17.7	16.7	17.8	17.9	18.6	18.4	
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	24.8	26.8	23.9	23.8	23.6	24.2	24.8	29.2	
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	6.8	8.4	6.2	7.1	5.8	6.3	6.2	10.8	
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									

República Democrática del Congo

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	83	73	94	96	96	94	74	69	
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	85	75	93	95	96	91	75	72	
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	1.7	2.1	1.2	1.3	1.0	1.2	1.9	2.4	
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	45	54	38	[41]	[47]	44	42	49	
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	15	24	8	13	5	12	20	31	
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	19	24	15	[22]	[19]	8	21	24	
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	4	8	2	2	2	2	7	12	
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	26	30	23	[19]	[28]	36	21	25	
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	10	16	6	10	3	10	13	19	
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	5	1	9	[6]	[12]	6	1	4	
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	26	30	24	18	20	32	31	31	
SECCIÓN 3 Maternidad										
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	19	15	22	20	29	19	23	9	
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ⁴	20.2	20.9	19.9	19.7	20.3	20.0	19.4	22.4	
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	73	90	63	59	61	70	88	100	

República Democrática del Congo

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	54	64	46	43	45	46	60	72	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	76	72	79	81	78	77	75	69	
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	4,400,000	1,962,000	2,437,000	792,000	840,000	950,000	920,000	898,000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	4,423,000	1,836,000	2,587,000	743,000	862,000	1,008,000	947,000	862,000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	3,739,000	1,922,000	1,817,000	568,000	606,000	737,000	785,000	1,043,000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	3,762,000	1,681,000	2,080,000	591,000	670,000	831,000	779,000	895,000	
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	59	73	50	43	49	55	66	84	
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	63	76	53	45	54	57	72	85	
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	95	96	94	94	91	97	92	98	
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	25	39	12	7	14	15	26	53	
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	32	47	21	14	18	28	36	59	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	77	82	56	50	74	54	72	90	
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	32	46	16	7	9	23	41	55	
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	25	46	3	2	2	1	16	72	
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	10	14	6	2	5	7	15	16	
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	4	7	1	0	1	1	3	10	

República Democrática del Congo

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	57	35	82	92	88	74	48	18

República Democrática del Congo

Año de la encuesta: 2007	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. Se calculó la mediana a base de las mujeres de 25–29 años.								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								

República Dominicana

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	39	37	41		57	47	35	32	27
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	50	52	44		48	50	47	52	52
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	82	81	86		93	89	83	80	68
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	92	93	89		89	93	93	89	94
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	15	14	18		27	20	14	9	8
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	24	25	20		24	24	23	23	24
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	51	48	57		71	63	53	42	32
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	70	73	63		64	71	71	71	75
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	27	24	33		47	36	25	17	12
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	5	4	5		7	7	5	3	2
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	66	62	78		88	81	68	55	47
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	35	33	40		46	45	35	27	18
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	17.8	18.0	17.4		16.3	17.2	17.3	18.3	19.2
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	18.5	19.0	17.7		16.9	17.5	17.9	19.5	21.6
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	0.7	1.0	0.3		0.6	0.3	0.6	1.2	2.4
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	16.3	16.3	16.5		16.2	16.2	16.4	16.5	16.3
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	23.9	24.2	23.4		23.4	22.8	23.2	24.9	26.1
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	7.6	7.9	6.9		7.2	6.6	6.8	8.4	9.8
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr

República Dominicana

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	91	91	90	86	90	92	93	92	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	91	91	90	86	92	92	93	91	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	72	74	66	63	70	72	75	76	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	90	93	84	79	88	93	94	95	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	83	84	83	80	84	85	85	83	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	88	88	87	84	87	89	88	89	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	41	42	37	31	38	41	45	46	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	34	37	27	21	33	37	38	41	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	87	88	86	82	86	86	90	91	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	88	88	87	83	87	88	90	90	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	83	85	81	77	82	85	86	87	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	98	98	97	95	98	98	98	98	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	97	97	96	94	97	97	98	98	

República Dominicana

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	4	3	6		8	6	4	2	1
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	7	6	10		13	8	7	5	3
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	489,000	332,000	157,000		94,000	105,000	108,000	96,000	85,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	504,000	330,000	174,000		109,000	115,000	104,000	96,000	79,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	482,000	341,000	141,000		82,000	90,000	96,000	101,000	112,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	492,000	338,000	154,000		101,000	92,000	98,000	96,000	195,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	90	90	90		86	89	92	93	90
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	88	88	89		82	88	91	92	91
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	102	102	101		104	101	102	102	99
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	53	57	44		27	41	51	65	74
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	38	43	28		16	23	33	53	65
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	140	133	159		173	182	156	123	113
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	86	87	83		74	83	89	88	93
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	93	95	89		78	93	97	97	98
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	55	58	50		39	49	56	65	63
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	49	52	43		30	43	52	58	59
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	2	2	4		9	3	1	0	0

República Dominicana

Año de la encuesta: 2007	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado								

Ruanda

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	14	17	14	16	13	14	14	15
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	22	19	22	20	19	23	20	24
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	58	59	57	68	62	57	52	51
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	61	64	60	67	58	62	53	64
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	4	4	4	4	3	3	4	5
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	11	8	12	12	10	13	12	10
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	17	21	16	20	15	15	15	18
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	27	27	27	29	20	27	26	31
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	4	3	4	5	4	4	4	2
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	0	0	0	0	0	1	0	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	41	36	42	55	49	43	37	28
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	20	9	22	37	26	24	15	10
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	21.3	21.5	21.3	20.6	21.2	21.5	21.6	21.7
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	22.3	24.3	22.0	21.5	22.1	22.0	22.0	24.3
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.0	2.8	0.7	0.9	0.9	0.5	0.4	2.6
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	22.0	21.6	22.1	22.3	21.6	22.3	21.7	22.0
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	25.3	†	24.7	24.0	24.0	24.7	25.1	†
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	3.3	nd	2.6	1.7	2.4	2.4	3.4	nd
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	40	38	40	52	44	39	32	34

Ruanda

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	25	17	26	31	32	24	24	19
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	5.4	5.7	5.4	5.0	5.3	5.3	5.5	5.8
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	17	*	13	*	*	*	*	[18]
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	33	*	32	*	*	*	*	[52]
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	51	64	49	45	45	53	42	67
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	17	*	13	*	*	*	*	[18]
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	29	*	27	*	*	*	*	[52]
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	47	63	44	40	38	45	40	65
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	28	52	24	18	21	22	25	48
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	0	*	0	*	*	*	*	[0]
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	*	4	*	*	*	*	[0]
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	5	1	5	5	7	8	2	2
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	73	*	74	*	*	*	*	[79]
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	6	*	7	*	*	*	*	[6]
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	5	4	5	7	6	4	5	3
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	22.9	24.0	22.8	22.2	22.7	22.7	23.0	24.1
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	87	91	86	83	80	89	93	93
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	40	46	39	30	46	43	44	43

Ruanda

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	96	97	95	94	96	95	96	97
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	96	98	96	95	96	96	97	97
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	56	40	59	66	63	59	56	40
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	25	19	26	34	30	26	23	16
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	643,000	89,000	555,000	97,000	185,000	127,000	122,000	112,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	637,000	87,000	549,000	105,000	175,000	125,000	115,000	117,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	541,000	104,000	437,000	76,000	142,000	96,000	83,000	145,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	534,000	89,000	446,000	74,000	133,000	111,000	94,000	122,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	88	94	88	81	87	89	91	95
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	86	90	86	78	85	87	89	93
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	102	104	102	104	103	101	103	101
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	16	29	14	6	9	11	18	32
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	15	24	13	7	10	12	16	26
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	107	122	102	79	88	97	115	126
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	71	84	68	42	59	72	83	89
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	12	47	6	2	2	4	5	39
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	4	6	4	4	3	4	5	6

Ruanda

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	1	3	1	0	0	0	1	3
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	27	11	30	56	40	26	16	7

Ruanda

Año de la encuesta: 2010	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

NOTAS

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

6. Los datos para el indicador 50 no estaban disponibles en la EDS de Ruanda de 2010; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Ruanda, la de 2005.

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado; nd = no disponible

† = menos del 50% de los hombres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.

* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.

[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

Senegal

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	30	19	40	58	39	23	23	15
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	19	21	17	24	17	23	14	19
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	69	55	83	93	81	69	64	49
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	45	42	50	65	50	58	34	37
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	11	5	16	26	15	8	6	3
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	5	5	5	9	6	5	2	4
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	34	21	48	66	48	32	24	15
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	21	20	23	30	23	29	12	18
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	25	14	36	52	34	16	20	12
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	1	0	1	3	0	1	0	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	62	46	78	89	74	61	56	43
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	6	1	13	27	6	4	1	1
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	19.4	21.1	17.9	16.2	17.5	19.8	20.3	22.4
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	19.9	22.2	18.0	16.4	17.8	20.3	20.8	23.8
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	0.5	1.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.4
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	22.7	22.5	23.2	21.3	21.5	24.0	26.1	21.5
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	28.9	31.2	27.0	25.9	27.4	29.3	29.7	33.1
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	6.2	8.7	3.8	4.6	5.9	5.3	3.6	11.6
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	69	57	80	88	78	72	63	49

Senegal

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	66	55	78	79	76	68	60	50
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	2.9	3.5	2.4	2.2	2.6	2.7	3.1	3.8
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	16	20	14	[18]	[23]	[20]	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	6	13	3	2	6	5	9	13
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	57	71	44	32	63	63	52	[81]
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	15	20	11	[18]	[16]	[20]	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	5	11	3	2	4	5	6	13
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	56	71	44	31	63	63	52	[81]
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	56	71	43	31	63	61	52	[79]
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	2	0	3	[0]	[7]	[0]	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	1	2	0	0	1	0	2	0
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	0	0	0	1	0	0	0	[0]
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	77	80	74	[61]	[72]	[77]	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	31	41	27	25	26	35	43	38
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	16	11	20	31	20	11	14	7
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	21.4	23.6	19.6	18.2	19.4	21.6	22.6	25.0
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	75	92	65	46	72	89	92	96
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	20	31	16	15	20	24	23	26

Senegal

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza						
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior		
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO										
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas										
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"									
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional										
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual										
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	42		48	36		31	37	41	46	50
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	43		46	40		38	36	45	46	48
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual										
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	19		27	12		10	10	17	23	32
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	44		61	28		24	31	41	51	65
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	75		88	59		55	61	76	80	89
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	70		80	61		50	63	70	77	84
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	87		89	84		76	85	88	89	91
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	29		41	18		10	20	26	35	48
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	33		43	20		14	18	25	42	51
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género										
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	31		38	25		23	22	29	36	43
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	27		29	26		27	29	28	26	28
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr		nr	nr		nr	nr	nr	nr	nr
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	79		86	72		65	73	78	84	89

Senegal

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	78	82	73	71	71	77	78	87
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	60	49	71	80	70	63	54	42
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	24	20	28	37	28	23	22	16
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	790,000	333,000	456,000	155,000	167,000	161,000	154,000	152,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	806,000	324,000	482,000	173,000	174,000	168,000	155,000	134,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	699,000	338,000	361,000	115,000	124,000	145,000	155,000	160,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	710,000	361,000	349,000	125,000	124,000	133,000	159,000	168,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	56	73	46	44	52	58	63	69
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	52	71	41	38	48	55	59	71
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	107	103	111	118	109	106	106	98
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	27	43	15	10	18	29	34	52
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	29	44	18	13	20	28	36	54
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	93	98	86	74	90	102	94	95
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	62	68	56	43	53	63	69	74
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	66	90	43	11	28	80	94	96
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	16	28	4	3	4	8	19	39
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	11	20	2	0	2	6	14	29

Senegal

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	19	6	31	52	36	12	4	1

Senegal

Año de la encuesta: 2010–11	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

NOTAS

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

6. Los datos para el indicador 50 no estaban disponibles en la EDS de Senegal de 2010–11; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Senegal, la de 2005.

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado; nd = no disponible

* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.

[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

Tanzania

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	50	32	58	71	67	55	45	30
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	51	32	57	78	68	43	51	27
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	5.2	5.8	5.0	4.5	4.7	5.1	5.4	5.9
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	40	44	38	[26]	33	38	43	51
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	15	[48]	9	6	7	11	27	[30]
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	42	64	38	32	29	37	43	78
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	36	36	35	[22]	27	38	42	41
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	12	[31]	9	6	7	9	23	[13]
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	42	61	37	32	29	37	42	75
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	38	52	35	26	27	36	37	70
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	5	8	3	[5]	6	0	1	10
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	[17]	1	0	0	2	3	[17]
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	1	3	1	1	0	0	1	3
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	50	47	51	[46]	57	57	47	44
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	16	[18]	16	19	14	11	17	[25]
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	17	12	19	20	22	18	19	11
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	19.6	20.2	19.4	19.0	19.2	19.3	19.4	21.5

Tanzania

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	58	86	50		41	42	54	69	88
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	27	40	24		22	22	23	36	36
CAPÍTULO 4 DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO										
SECCIÓN 1 Educación en sexualidad en las escuelas										
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual										
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH ⁴	65	70	65		58	62	70	67	67
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH ⁴	72	67	76		76	78	76	71	63
SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual										
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	70	79	67		61	66	68	73	78
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	81	88	78		72	76	80	85	86
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	88	95	86		83	86	84	89	96
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	76	79	75		71	74	78	78	79
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	87	94	85		80	83	85	90	94
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	48	55	45		39	46	46	50	55
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁵	43	57	37		34	31	39	47	56
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género										
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	60	68	58		55	56	60	59	72
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{4,6}	63	70	61		56	60	63	63	72

Tanzania

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{4,6}	63	64	63		62	63	66	63	64
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	80	87	78		72	77	79	83	88
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	87	89	86		82	86	86	86	91
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	54	43	58		61	59	60	57	36
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	38	27	42		46	46	42	37	25
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	2,802,000	602,000	2,199,000		504,000	614,000	616,000	566,000	499,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	2,834,000	539,000	2,296,000		575,000	624,000	643,000	556,000	436,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	2,413,000	704,000	1,708,000		314,000	449,000	483,000	533,000	637,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	2,426,000	597,000	1,829,000		395,000	471,000	541,000	526,000	493,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	81	87	80		68	76	86	87	90
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	78	90	76		67	73	80	85	91
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	104	97	105		101	104	107	102	98
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	25	43	18		7	9	18	32	46
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	26	45	20		10	11	20	34	53
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	95	97	89		69	79	91	93	87
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	60	76	54		32	43	59	68	80
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	32	69	16		8	6	18	24	76

Tanzania

Año de la encuesta: 2010		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	26	42	20	12	13	24	28	42
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	12	29	6	1	1	9	10	30
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	30	9	39	58	52	35	23	5

Tanzania

Año de la encuesta: 2010	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. Los datos tanto para los indicadores 40 y 41 como para los indicadores 50 y 51, no estaban disponibles en la EDS de Tanzania de 2010; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Tanzania, la de 2004–05.								
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								

Ucrania

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	18	19	15		23	12	21	15	21
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	33	33	33		38	38	36	26	30
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	78	79	74		78	74	78	78	81
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	92	92	91		90	93	95	91	90
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	1	1	1		2	1	2	1	1
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	2	2	1		1	1	4	3	1
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	28	29	25		35	24	24	30	29
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	44	44	43		50	49	48	37	41
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	7	7	7		9	3	14	3	5
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	3	3	3		6	3	5	4	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	53	51	58		60	58	54	49	49
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	26	26	23		24	28	25	25	25
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	19.3	19.4	19.0		19.2	18.8	19.0	19.3	19.8
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	21.2	21.5	20.1		20.8	19.9	20.9	20.8	22.2
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.9	2.1	1.1		1.6	1.1	1.9	1.5	2.4
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	18.6	18.5	18.7		18.8	18.4	18.2	19.3	18.6
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	23.7	23.8	23.6		22.9	23.8	24.0	23.6	24.0
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	5.1	5.3	4.9		4.1	5.4	5.8	4.3	5.4
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	42	41	45		48	40	43	44	40

Ucrania

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico en los últimos meses	79	79	78	81	78	84	76	76
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	3.8	4.0	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8	4.1
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	84	[85]	[81]	*	*	*	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	48	[55]	*	*	*	*	*	*
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	77	77	76	78	69	82	81	77
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	81	[82]	[76]	*	*	*	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	43	[47]	*	*	*	*	*	*
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	68	71	60	61	55	72	73	74
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	64	67	57	57	54	65	69	70
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	[3]	[5]	*	*	*	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	6	[8]	*	*	*	*	*	*
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	9	6	16	17	14	10	8	2
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	16	[15]	[20]	*	*	*	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	30	[25]	*	*	*	*	*	*
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	3	2	4	6	2	4	2	1
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	23.1	23.7	21.5	22.8	21.4	22.6	23.0	†
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	99	99	99	99	99	99	99	99
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	23	22	24	38	18	21	37	6
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO								
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas								

Ucrania

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2		Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual								
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	93	94	92	92	92	93	94	94	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	83	84	78	74	81	84	85	85	
SECCIÓN 3		Autoeficacia en salud sexual								
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	58	62	48	47	50	57	66	65	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	96	97	93	91	96	96	97	97	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	98	98	97	98	98	98	97	98	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	92	93	89	91	90	92	92	93	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	89	90	86	85	87	89	90	90	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	45	48	37	33	41	46	55	45	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	43	45	36	28	40	51	47	42	
SECCIÓN 4		Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género								
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	97	97	98	96	98	97	98	98	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	83	85	77	75	81	81	85	87	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	68	70	64	57	65	73	70	72	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	97	98	95	95	96	97	98	98	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	95	96	94	93	95	96	96	95	

Ucrania

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	4	3	5		7	5	4	2	2
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	11	10	14		21	12	9	11	7
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	984,000	580,000	403,000		174,000	237,000	189,000	178,000	207,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	1,036,000	643,000	393,000		167,000	240,000	199,000	228,000	202,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	1,279,000	833,000	446,000		216,000	304,000	239,000	256,000	264,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	1,339,000	885,000	454,000		193,000	296,000	264,000	286,000	300,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria ⁷	90	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
61	% de niños que asisten a la escuela primaria ⁷	90	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria ⁷	100	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria ⁷	85	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria ⁷	84	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria ⁷	99	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	69	74	61		54	64	68	76	84
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	98	98	98		98	98	98	97	99
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	69	72	63		64	69	67	71	73
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	51	56	42		37	49	50	54	62
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	1	0	2		2	1	1	0	0

Ucrania

Año de la encuesta: 2007	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
7. Los datos sobre la asistencia escolar (indicadores 60 a 65) no estaban disponibles en la EDS de Ucrania. Por lo tanto, los datos, que son para el mismo año, provienen de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, y se refieren a la matrícula escolar, de modo que son los porcentajes de jóvenes de edad de escuela primaria y secundaria que estaban matriculados en cada nivel.								
<p>nd = no disponible</p> <p>† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.</p> <p>* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.</p> <p>[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.</p>								

Uganda

Año de la encuesta: 2006		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	43	45	43		52	48	37	40	41
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	35	33	36		36	36	39	33	34
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	92	87	94		96	96	91	93	89
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	86	85	87		91	85	84	85	87
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	16	12	16		18	18	15	17	12
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	12	15	11		10	9	15	11	15
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	62	53	65		70	71	57	62	56
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	48	53	46		45	47	44	43	56
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	22	17	24		40	32	19	19	12
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	2	0	2		3	4	2	1	0
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	78	58	84		88	90	82	83	59
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	44	30	48		54	57	52	33	29
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	16.7	17.3	16.6		16.2	16.6	16.5	16.8	17.3
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	18.0	19.3	17.7		17.2	17.4	17.5	18.0	19.6
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.3	2.0	1.1		1.0	0.8	1.0	1.2	2.3
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	17.9	17.6	18.0		18.6	17.3	18.0	18.3	17.5
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	21.9	24.1	21.7		22.4	22.2	21.3	21.3	22.4
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	4.0	6.5	3.7		3.8	4.9	3.3	3.0	4.9
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									

Uganda

Año de la encuesta: 2006		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	46	31	50	67	57	50	41	32	
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	38	34	38	61	41	35	31	29	
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.3	4.9	4.2	3.5	3.8	4.2	4.3	5.0	
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	36	[52]	31	*	*	*	[41]	51	
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	11	25	9	7	7	6	12	31	
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	42	61	38	31	26	37	52	68	
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	31	[43]	28	*	*	*	[33]	44	
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	8	25	5	2	4	4	7	29	
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	38	58	33	28	24	27	47	63	
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	31	47	27	25	21	19	37	53	
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	5	[8]	4	*	*	*	[8]	6	
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	3	0	4	5	3	2	4	1	
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	5	3	5	3	2	9	5	5	
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	55	[42]	59	*	*	*	[55]	48	
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	34	24	35	34	38	34	35	27	
SECCIÓN 3 Maternidad										
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	19	16	20	30	26	17	17	13	

Uganda

Año de la encuesta: 2006		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	18.8	19.4	18.7	18.3	18.5	18.4	19.0	19.7	
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	54	79	49	37	42	56	61	78	
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	41	34	42	42	41	35	41	43	
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	64	67	63	59	62	67	66	64	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	66	62	67	63	72	62	68	63	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	34	49	30	21	24	32	36	48	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	70	88	65	47	60	67	72	89	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	90	95	88	80	88	91	92	94	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	70	77	69	58	65	67	75	81	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	89	92	89	85	88	89	90	94	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	32	48	28	20	21	30	31	47	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	38	45	37	28	32	38	41	47	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									

Uganda

Año de la encuesta: 2006		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	61	64	60	70	60	58	54	60	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	61	67	60	60	61	55	60	66	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	64	71	62	54	63	62	65	70	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	70	56	73	75	77	74	74	55	
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	59	45	62	64	68	61	58	49	
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	2,266,000	256,000	2,010,000	419,000	417,000	474,000	496,000	460,000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	2,275,000	216,000	2,059,000	421,000	428,000	498,000	491,000	439,000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	1,902,000	335,000	1,567,000	306,000	321,000	337,000	382,000	557,000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	1,883,000	271,000	1,612,000	292,000	307,000	378,000	424,000	482,000	
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	81	87	81	71	78	82	87	89	
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	82	90	82	73	83	82	86	89	
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	99	96	99	97	95	100	100	100	
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	16	35	13	3	6	9	13	39	
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	16	36	14	3	6	9	16	38	

Uganda

Año de la encuesta: 2006		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	101	97	97	78	102	101	81	101	
SECCIÓN 3		Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	75	92	72	44	68	71	81	94	
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	14	45	7	1	1	2	8	39	
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	23	42	19	8	12	12	20	44	
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	8	27	4	0	1	0	4	25	
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	22	5	26	54	29	27	16	3	

Uganda

Año de la encuesta: 2006	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nr = no recopilado								
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.								
[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								

Vietnam^{1,2}

Año de la encuesta: 2002		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio									
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	4	2	5	nd	nd	nd	nd	nd	
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	48	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ³	21.1	24.9	20.3	nd	nd	nd	nd	nd	
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos									

Vietnam^{1,2}

Año de la encuesta: 2002		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	30	*	29	*	*	*	*	*
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	1.9	2.2	1.9	1.2	2.0	2.2	1.8	3.0
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	23	*	23	*	*	*	*	*
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	14	*	13	*	*	*	*	*
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	9	*	9	*	*	*	*	*
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	13	*	11	*	*	*	*	*
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	2	1	2	nd	nd	nd	nd	nd
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ³	22.6	†	21.7	nd	nd	nd	nd	nd

Vietnam^{1,2}

Año de la encuesta: 2002		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón ⁴	83	86	82	68	83	85	88	89
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN								
SECCIÓN 1	Información demográfica								
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	3,234,000	433,000	2,800,000	nd	nd	nd	nd	nd
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	3,390,000	515,000	2,875,000	nd	nd	nd	nd	nd
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	4,224,000	735,000	3,489,000	nd	nd	nd	nd	nd
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	4,404,000	797,000	3,607,000	nd	nd	nd	nd	nd
SECCIÓN 2	Asistencia escolar								
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria ⁶	37	53	34	nd	nd	nd	nd	nd
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria ⁶	45	60	42	nd	nd	nd	nd	nd

Vietnam^{1,2}

Año de la encuesta: 2002		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria ⁶	82	89	80	nd	nd	nd	nd	nd	
SECCIÓN 3		Exposición a los medios de comunicación								
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	52	36	54	32	61	57	61	57	
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	78	85	78	56	81	89	88	100	
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	31	20	31	26	18	50	28	41	
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	24	20	25	26	18	24	28	41	
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	16	15	16	38	8	11	12	0	

Vietnam^{1,2}

Año de la encuesta: 2002	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
<p>1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de Vietnam. No se recopilaban datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan los porcentajes de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente.</p>								
<p>2. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS de Vietnam de 2002, de modo que no están disponibles los datos masculinos para muchos indicadores, entre ellos, iniciación sexual y marital y uso anticonceptivo. Sí están disponibles algunos datos de población y de matrícula escolar para el año de la EDS, 2002. Sin embargo, los datos de hombres para los indicadores 41, 44 y 48 provienen de otra encuesta llevada a cabo en Vietnam, la Encuesta de Indicadores sobre VIH/SIDA de 2005 (conocido por sus siglas en inglés, AIS).</p>								
<p>3. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 25–29 años.</p>								
<p>4. Los indicadores 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 52 no estaban disponibles en la EDS de 2002; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la AIS de Vietnam de 2005.</p>								
<p>5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.</p>								
<p>6. Los datos son de la matrícula escolar en 2002. Debido a la falta de comparabilidad en los datos recopilados en la EDS, los valores presentados (indicadores 63 y 64) solo indican los porcentajes de jóvenes que estaban matriculados en la secundaria alta en 2002 (porcentaje de los de 16–20 años). No se muestran los porcentajes matriculados en secundaria baja (85% de las adolescentes de 11–15 años y 89% de los adolescentes de la misma edad en 2002).</p>								

Vietnam^{1,2}

Año de la encuesta: 2002	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior

nr = no recopilado; nd = no disponible
 † = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
 * = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.
 [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

Zambia

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
CAPÍTULO 3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
SECCIÓN 1	Actividad sexual y matrimonio								
1	% de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	48	40	56	57	56	58	49	33
2	% de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales	45	40	49	53	47	47	50	35
3	% de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	93	87	98	99	98	97	96	78
4	% de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales	86	81	91	89	91	93	86	77
5	% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	14	10	17	19	16	16	13	7
6	% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años	16	15	17	17	20	18	16	13
7	% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	59	46	68	71	73	65	60	36
8	% de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años	51	47	55	56	54	56	54	42
9	% de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas	19	13	26	27	26	29	19	7
10	% de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos	1	2	1	1	1	1	2	1
11	% de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas	74	59	85	90	82	86	76	45
12	% de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos	29	18	39	47	45	34	28	9
13	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes ¹	17.4	17.9	17.0	17.2	17.0	16.6	17.0	18.8
14	Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	18.7	20.1	18.1	18.2	18.0	17.7	18.3	22.1
15	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes ¹	1.3	2.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	3.3
16	Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes ²	17.9	18.4	17.3	17.0	17.6	18.0	17.3	19.1
17	Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes ²	23.5	25.5	22.7	22.3	23.1	22.8	23.9	26.6
18	Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes ²	5.6	7.1	5.4	5.3	5.5	4.8	6.6	7.5
SECCIÓN 2	Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos								
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	64	50	77	90	84	68	60	43

Zambia

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	58	47	69	73	75	67	58	39
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	3.5	3.9	3.1	2.9	3.0	3.2	3.7	4.1
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	28	25	30	[41]	[31]	23	22	[28]
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	28	36	25	[20]	28	25	31	*
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	43	52	38	35	30	40	46	63
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	26	25	27	[38]	[27]	21	22	[28]
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	17	26	13	[10]	16	12	23	*
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	41	50	35	32	29	37	46	61
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	35	43	30	28	23	32	38	54
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	2	0	3	[3]	[5]	3	0	[1]
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	11	10	11	[11]	12	13	8	*
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	2	1	2	3	2	3	1	1
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	64	70	60	[52]	[64]	56	77	[64]
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	22	27	20	[26]	17	23	19	*
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	22	17	27	31	24	27	22	13
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	19.2	20.4	18.8	18.8	18.9	18.4	18.7	21.8
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	60	87	44	36	39	50	80	91

Zambia

	Año de la encuesta: 2007	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
	Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	44	59	35	30	33	41	53	64	
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	56	55	56	54	60	57	53	55	
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	68	67	68	66	71	69	65	68	
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	40	39	40	39	38	42	43	37	
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	76	80	72	69	72	73	78	81	
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	88	93	83	82	81	84	92	93	
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	73	73	73	75	72	73	72	75	
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	90	90	90	90	89	89	89	92	
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	34	42	27	24	26	26	36	48	
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	37	46	29	24	25	30	39	51	
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	65	72	61	56	61	66	66	77	
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	39	40	38	42	38	34	37	43	

Zambia

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior	
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ⁵	58	64	53	50	54	54	59	69	
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	74	79	70	67	69	71	78	81	
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	87	91	85	84	82	85	89	93	
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	62	56	66	65	68	71	65	47	
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁶	48	42	53	48	56	59	51	34	
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	864,000	330,000	534,000	174,000	150,000	168,000	169,000	202,000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	870,000	299,000	572,000	176,000	179,000	179,000	171,000	165,000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	719,000	344,000	375,000	102,000	115,000	119,000	173,000	210,000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	723,000	333,000	390,000	116,000	93,000	134,000	160,000	218,000	
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	80	87	77	74	74	80	85	88	
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	80	88	76	72	75	80	85	91	
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	100	99	101	104	99	100	100	97	
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	35	53	21	5	19	22	41	63	
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	38	58	24	14	20	25	44	69	
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	93	91	85	38	95	88	93	91	
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	58	68	49	41	42	51	59	79	

Zambia

Año de la encuesta: 2007		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	36	64	10	2	2	9	34	88
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	29	39	20	17	15	19	27	50
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	15	26	4	0	0	3	12	39
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	29	15	43	52	50	41	27	3

Zambia

Nombre del indicador	Nacional		Residencia		Quintil de riqueza				
			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS									
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.									
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.									
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).									
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.									
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.									
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.									
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables.									
[] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.									

Zimbabue

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador			Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
19	% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	75	67	80	90	81	80	72	61
20	% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses	74	61	79	87	82	79	70	54
21	Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años	4.1	4.3	4.0	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5
22	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo	25	[24]	25	[36]	*	*	*	*
23	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo	36	33	37	38	32	38	39	[32]
24	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método anticonceptivo	64	70	62	52	57	69	66	77
25	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	25	[24]	25	[36]	*	*	*	*
26	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	35	29	37	37	32	34	38	[32]
27	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción	63	68	61	52	57	65	64	76
28	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente condón	42	47	40	27	40	40	45	60
29	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	0	[0]	0	[0]	*	*	*	*
30	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	2	4	1	1	0	4	1	[32]
31	% de hombres de 15–24 años sexualmente activos ³ que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción	1	2	1	0	0	3	1	2
32	% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, ³ nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	59	[59]	59	[52]	*	*	*	*
33	% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción	17	27	13	18	14	16	21	[16]
SECCIÓN 3	Maternidad								
34	% de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo	19	12	23	31	20	23	19	7
35	Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes ¹	20.5	21.8	19.8	19.3	19.5	20.0	20.7	22.5

Zimbabue

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
36	% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud	65	81	60		48	55	67	78	87
37	% de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados	33	40	30		28	29	30	37	44
CAPÍTULO 4	DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO									
SECCIÓN 1	Educación en sexualidad en las escuelas									
38	% de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico	Ver cuadro "Educación en sexualidad en las escuelas"								
39	Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional									
SECCIÓN 2	Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual									
40	% de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	37	43	34		29	34	36	39	45
41	% de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH	48	55	44		39	40	42	52	59
SECCIÓN 3	Autoeficacia en salud sexual									
42	% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios	42	38	44		43	41	47	42	37
43	% de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	64	63	65		62	66	65	65	64
44	% de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón	82	88	79		74	77	79	86	90
45	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón	81	84	79		75	79	82	83	84
46	% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada	90	92	89		84	90	90	91	93
47	% de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	52	59	47		41	50	48	55	61
48	% de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA ⁴	47	57	42		34	42	43	48	62
SECCIÓN 4	Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género									
49	% de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud	84	86	83		83	83	84	82	89

Zimbabue

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
50	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	54	62	50		45	49	52	57	64
51	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo ^{5,6}	51	58	46		42	47	42	55	62
52	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	80	82	79		73	79	81	83	83
53	% de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón	83	88	81		75	78	82	87	90
54	% de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	40	29	46		52	49	46	34	25
55	% de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa ⁷	33	27	37		39	40	38	32	23
CAPÍTULO 5	FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN									
SECCIÓN 1	Información demográfica									
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	789,000	191,000	598,000		174,000	179,000	183,000	124,000	129,000
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	790,000	188,000	602,000		184,000	176,000	178,000	129,000	122,000
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	812,000	319,000	493,000		125,000	138,000	161,000	162,000	224,000
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	806,000	235,000	572,000		138,000	156,000	194,000	164,000	154,000
SECCIÓN 2	Asistencia escolar									
60	% de niñas que asisten a la escuela primaria	87	90	87		83	88	88	89	90
61	% de niños que asisten a la escuela primaria	87	86	87		84	88	86	86	90
62	Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria	101	105	100		99	100	101	104	101
63	% de mujeres que asisten a la escuela secundaria	48	56	44		31	45	49	51	63
64	% de hombres que asisten a la escuela secundaria	47	62	43		27	43	47	52	69
65	Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria	102	91	104		114	106	104	98	90

Zimbabue

Año de la encuesta: 2010–11		Nacional	Residencia		Quintil de riqueza					
Nombre del indicador			Urbana	Rural		Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
SECCIÓN 3	Exposición a los medios de comunicación									
66	% de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana	34	47	26		10	21	31	44	51
67	% de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana	38	72	17		3	8	14	57	81
68	% de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana	18	30	10		3	8	14	19	34
69	% de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos)	9	17	4		0	3	3	11	21
70	% de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación	47	18	65		87	72	61	30	10

Zimbabue

Año de la encuesta: 2010–11	Nacional	Residencia		Quintil de riqueza				
Nombre del indicador		Urbana	Rural	Inferior	Segundo	Intermedio	Cuarto	Superior
NOTAS								
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.								
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.								
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).								
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.								
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.								
6. Los datos para los indicadores 50 y 51 no estaban disponibles en la EDS de Zimbabue de 2010–11; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Zimbabue, la de 2005–06.								
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.								
nd = no disponible † = menos del 50% de las personas encuestadas de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad. * = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay suficiente información para generar datos confiables. [] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.								